

Acetazolamida 250 mg Comprimidos

Composición y presentación:

Cada comprimido contiene:

Acetazolamida 250 mg

Excipientes : Almidón glicolato de sodio, almidón pregelatinizado, celulosa microcristalina, magnesio estearato, calcio fosfato.

Indicaciones:

Reducción de la presión intraocular en la prevención o tratamiento del glaucoma de ángulo abierto glaucoma secundario. Diuresis. Alcalinización de la orina. Manejo de edemas secundarios a enfermedad cardíaca congestiva o terapias con fármacos. Epilepsia tipo ausencias (Petit Mal). Prevención del mal de alturas.

Clasificación:

Antiglaucomatoso. Diurético.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Puede existir riesgo de acidosis en caso de obstrucción respiratoria.

Contraindicaciones:

No usar en personas que presenten:

- Hipersensibilidad a acetazolamida o a las sulfonamidas.
- Enfermedad renal o hepática.
- Pérdida del sodio y del potasio.
- Acidosis hiperclorémica.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Hipoglicemiantes sulfonilureicos: (tolbutamida , clorpropamida, glibenclamida, glipizida) aumento de la glicemia.

Antidepresivos tricíclicos: (imipramina, amitriptilina) delirio, coma, convulsiones.

Antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, piroxicam, diclofenaco) Glucósidos cardíacos, (digitoxina, digoxina), Anfotericina B, Corticoesteroides (prednisona, betametasona) aumento del riesgo de toxicidad.

Reacciones adversas o efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: náuseas, vómito, cefalea, sensación de malestar y debilidad, sabor metálico y anorexia (pérdida del apetito). Pérdida de potasio, reacciones alérgicas (rash cutáneo, fiebre, prurito), somnolencia, confusión, fatiga.

Precauciones:

Para tratamientos prolongados, se recomienda realizar un control de las concentraciones sanguíneas de sodio y potasio. Administrar con precaución y sólo bajo indicación médica en pacientes geriátricos, mujeres embarazadas y durante el período de lactancia. Si se acentúan las reacciones al medicamento; administrar líquidos y determinar los niveles de potasio, que suelen bajar.

Dosis:

Adulto, 250-1000 mg/día dividido en varias dosis.

Niños, 5-15 mg/kg/día en dosis divididas.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral. En litiasis renal, (cálculos renales) administrar solamente al acostarse.

Sobredosis:

No se tiene antecedentes. En caso de aparición de síntomas sospechosos de sobredosis, trasladar al enfermo a un centro asistencial para su tratamiento.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original, protegido del calor y humedad.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.