

Amitriptilina clorhidrato

Comprimidos recubiertos 25 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido recubierto contiene:

Amitriptilina clorhidrato 25 mg

Excipientes: Celulosa microcristalina, almidón glicolato de sodio, magnesio estearato, lactosa, talco, recubrimiento polimérico, titanio dióxido, macrogol.

Clasificación:

Antidepresivo.

Indicaciones:

Tratamiento del síndrome depresivo mayor, enfermedad maníaco depresiva, depresión con signos vegetativos o melancólicos.

Advertencia especial:

Este medicamento no debe administrarse a menores de 18 años de edad. Se ha visto que el uso de antidepresivos en niños y adolescentes aumenta el riesgo de pensamientos y conductas suicidas.

Advertencias y precauciones:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Puede agravar algunas enfermedades cardíacas. Puede producir somnolencia; tener presente al conducir vehículos o realizar trabajos que requieran estado de alerta. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas durante el tratamiento; cuidar el aseo dental para prevenir la aparición de caries. No suspender la medicación sin consultar al médico.

Advertir a su médico si usted padece cualquiera de las siguientes enfermedades: epilepsia, glaucoma, afecciones hepáticas, cardiovasculares, trastornos psiquiátricos.

No se recomienda para estados depresivos en niños menores de 18 años.

Pacientes mayores de 60 años: los efectos adversos pueden ser más severos, por lo que se deben utilizar dosis más bajas que lo habitual, según la indicación del médico.

Contraindicaciones:

No usar en caso de haber presentado previamente reacciones de hipersensibilidad (alergias o reacción inesperada) al fármaco, trastornos cardíacos como infarto reciente al miocardio, bloqueo cardíaco, arritmias ventriculares; glaucoma o enfermedad hepática severa y en la fase maníaca de trastornos psiquiátricos. No asociar con inhibidores de la monoaminoxidasa (moclobemida, selegilina, isocarboxazida, furazolidona)

Embarazo y Lactancia: Evitar su uso en el embarazo y durante la lactancia.

Interacciones:

Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: Anticoagulantes orales, Alcohol, Barbitúricos, Disulfiram, Medicamentos Espasmolíticos, Cimetidina, Clonidina, Guanetidina, Matrizamida, Fenilpropanolamina, Isoproterenol, Efedrina, Epinefrina, Anfetamina, Fenilefrina, Primozida, Metildopa, Metirozina, Metoclopramida, Pemolina, Prometazina, Trimeprazina o cualquier droga depresora del sistema nervioso central o inhibidores del apetito (para adelgazar).

Inhibidores de la monoaminoxidasa (Isocarboxazida, Moclobemida, Selegilina, Furazolidona).

No se recomienda la asociación con estos productos, salvo supervisión médica.

Efectos adversos:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, acuda a su médico: confusión, delirio o alucinaciones; estreñimiento especialmente en ancianos; micción dificultosa; dolor en los ojos (agravamiento del glaucoma). Palpitaciones, temblores musculares en brazos, manos, cabeza; desmayos, nerviosismo; sensibilidad a la luz solar, rash cutáneo, picazón, manchas rojas o pardas en la piel, inflamación de la cara o lengua, abultamiento de los pechos, enronquecimiento de la voz y dolor de garganta.

El uso de este medicamento puede producir algunos efectos que usualmente no requieren atención médica a menos que persistan o se agraven; somnolencia, mareos, sequedad de boca, dolor de cabeza, aumento de peso y del apetito, náuseas, debilidad leve, sabor a metal, alteraciones visuales (visión borrosa).

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento apropiados a su caso particular; no obstante, las dosis usuales recomendadas son: 25 mg (un comprimido) tres veces al día al inicio de la terapia. Esta dosis se puede subir gradualmente hasta 150 mg al día, (6 comprimidos) repartidos en 3 tomas diarias.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral con un vaso de agua. Tomar las dosis exactamente como lo indique su médico.

Sobredosis:

Los síntomas predominantes corresponden a una exacerbación de las reacciones adversas: por lo tanto se observa sequedad de la boca y mucosas, retención de orina, parálisis intestinal, palpitaciones y arritmias graves, confusión, excitación, convulsiones y coma. Si se presentan estos síntomas, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial, para su tratamiento y medidas de mantención necesarias. Llevar el envase del medicamento ingerido.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original; fuera del alcance de los niños; protegido del calor y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.