

Azitrom

Comprimidos recubiertos 500 mg

Azitromicina

Composición y presentación:

Cada comprimido recubierto contiene:

Azitromicina (como dihidrato) 500 mg

Excipientes: Almidón pregelatinizado, celulosa microcristalina, talco, almidón glicolato de sodio, dióxido silicílico coloidal, magnesio estearato, poliacrilatos dispersión, macrogol, hipromelosa, titanio dióxido, simeticona, colorante FD&C azul N° 2 lacado.

Clasificación:

Antibiótico.

¿Para qué se usa?:

Este medicamento se usa para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo y superior, piel y tejidos blandos. También es el medicamento de elección en el tratamiento de infecciones no complicadas causadas por CHLAMYDEA TRACHOMATIS.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

Advertencias:

Los pacientes que toman este medicamento deben informar a su médico en caso que tengan antecedentes de enfermedad cardíaca o en caso que experimenten molestias como palpitaciones, fatiga, ahogos u opresión torácica.

Los pacientes que toman azitromicina no deben dejar de tomarla antes del fin de su tratamiento, sin antes consultar a su profesional de la salud.

Administración (oral):

Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Infecciones del tracto respiratorio: 500 mg el primer día seguido de 250 mg por 4 días.

Se toma en una sola dosis al día.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

Consejo de cómo administrarlo

Puede tomar este medicamento con o sin comida.

Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

Precauciones:

Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con azitromicina.

Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de azitromicina.

Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

Embarazo

Usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

Lactantes y niños

No se recomienda el uso de azitromicina en niños menores de 6 meses, a menos que su médico así lo indique.

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

Precauciones especiales

Debe tomar todas las dosis que se le hayan recetado, aunque se sienta bien luego de unos pocos días de tratamiento, ya que si no sigue las indicaciones de su médico la infección puede volver a presentarse. Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a azitromicina, eritromicina, claritromicina, etc. Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Interacciones:**Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: warfarina, carbamazepina, fenitoína, clorfenamina, teofilina, antiácidos.

Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de alguna enfermedad al hígado.

Efectos adversos:

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, rash, hinchazón de la cara, boca, labios, garganta, o lengua, coloración amarilla de ojos o piel.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarreas, náuseas, dolor abdominal.

Sobredosis:

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, protegido del calor, la humedad y fuera del alcance de los niños. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.