

Clotrimazol

Crema Tópica 1%

Composición y presentación:

Cada gramo de crema contiene:

Clotrimazol 10 mg

Excipientes: Alcohol bencílico, alcohol cetosteárico, polioxil - 20 - cetileter, fosfato monobásico de sodio dihidrato, vaselina líquida, agua purificada, vaselina sólida.

Clasificación:

Antifúngico.

Indicaciones:

Este medicamento está indicado en el tratamiento de la tinea pedis, tinea cruris y tinea corporis causada por Trichophyton, Epidermophyton y Microsporum. Candidiasis causada por Candida Albicans y tinea versicolor causada por Malassezia Furfur complicadas con inflamación y prurito.

Administración (tópica):

Rango y frecuencia

Aplicar la crema al 1% dos veces al día en la zona afectada.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

Consejo de cómo administrarlo

Lave la zona afectada antes de administrar el medicamento, para eliminar escamas y restos del último tratamiento. No debe utilizar vendajes que no permitan transpirar a la zona de infección.

Uso prolongado

En general se utiliza solo en tratamientos cortos de 1 a 14 días. No debe usarlo por más o menos tiempo que el señalado por su médico.

Precauciones:

Mayores de 60 años

No existen recomendaciones especiales para los ancianos.

Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

Embarazo

Este medicamento se absorbe en cantidades mínimas, es poco probable que dañe al feto.

Lactancia

Este medicamento puede ser absorbido (aunque en pequeñas cantidades) por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta con su pediatra. No existen precauciones especiales en el caso del clotrimazol tópico.

Precauciones especiales

Para conseguir una curación completa de la infección es muy importante que complete el tratamiento descrito por su médico, en términos de frecuencia y días de utilización, aunque los síntomas hayan desaparecido antes.

Debe evitar el contacto de la crema con los ojos.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Contraindicaciones:

Si ha presentado síntomas de alergia al clotrimazol u otro antifúngico azólico. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Interacciones:

Medicamentos: Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

Efectos adversos:

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

Sobredosis:

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, protegido del calor y fuera del alcance de los niños. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.

D-ME-E12235-04.