

Dolospam®

Comprimidos

Composición:

Cada comprimido contiene:

Atropina sulfato 0,50 mg

Papaverina clorhidrato 40 mg

Excipientes: Polividona, almidón glicolato de sodio, celulosa microcristalina, almidón de maíz, lactosa monohidrato, lauril sulfato de sodio, magnesio estearato.

Indicaciones:

Tratamiento sintomático de los espasmos intestinales, cólicos (bilíares y renales) y dismenorrea.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento apropiado a su caso en particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Adultos:** 1 comprimido cada 6 – 8 horas.

- **Dosis máxima:** 8 comprimidos al día.

Guarde este medicamento en su envase original, fuera del alcance de los niños; protegido del calor y la humedad.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No administrar en menores de 12 años sin indicación médica.

Modo de empleo:

Administrar con agua.

Precauciones:

Dolospam debe ser administrado con precaución a pacientes con motilidad gastrointestinal reducida, pacientes con hipertrofia prostática, presencia de desórdenes en la conducción cardíaca o enfermedad cardiovascular inestable. Administrar con precaución en niños menores de 6 años.

Advertencias:

Dolospam por contener atropina debe administrarse con cuidado a pacientes con hipertensión y senescentes.

Si aparece dolor ocular se debe suspender la administración del medicamento. Se debe evitar el uso de Dolospam por períodos prolongados, salvo estricta indicación médica.

Contraindicaciones:

Dolospam está contraindicado en pacientes con íleo parálitico y estenosis pilórica.

No debe administrarse a pacientes con miastenia gravis, presión ocular elevada (glaucoma), retención urinaria y colitis ulcerativa.

Evitar su uso en embarazo y lactancia.

Interacciones:

Infórmele a su médico de todos los medicamentos que está consumiendo, puede que alguno de éstos modifique el efecto esperado de Dolospam.

Efectos adversos:

En dosis normales se puede producir visión borrosa, sequedad de nariz y boca, bradicardia y bochorno, midriasis, conjuntivitis, edema de los párpados y retención urinaria. También puede provocarse constipación, distensión abdominal y anorexia.

Condiciones de almacenamiento:

Guarde este medicamento en su envase original, fuera del alcance de los niños; protegido del calor y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.