

Flunitrazepam 2 mg Comprimidos

Composición y presentación:

Cada comprimido contiene:

Flunitrazepam 2 mg

Excipientes: Lactosa, colorante FD&C amarillo N° 6, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, magnesio estearato.

Indicaciones:

Tratamiento del insomnio como inductor del sueño, por períodos cortos.

Clasificación:

Hipnótico.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Flunitrazepam es un inductor rápido del sueño; se recomienda tomarlo inmediatamente después de estar en la cama. Puede inducir dependencia; usar por períodos cortos de tratamiento.

Contraindicaciones:

No usar en caso de hipersensibilidad a la droga. Depresión no tratada. Glaucoma agudo de ángulo cerrado. Miastenia gravis, insuficiencia respiratoria. No administrar en mujeres embarazadas y durante el período de lactancia.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Antidepresivos, antiácidos, antihipertensivos en general, alcohol, antihistamínicos, antipsicóticos, disulfiram, cimetidina, levodopa, clonidina, talidomida. No se recomienda su asociación con estos productos, salvo indicación del médico.

Reacciones adversas:

El uso de este medicamento puede producir algunos efectos adversos que normalmente no requieren atención médica a menos que sean muy molestos: torpeza e inestabilidad, especialmente en pacientes geriátricos o debilitados: mareos, aturdimiento, somnolencia residual durante el día cuando se utiliza como hipnótico, hablar confuso, malestar estomacal, náuseas, vómito, visión borrosa.

Si se presentan reacciones adversas más graves mientras esté en tratamiento con este producto, acuda a su médico: Confusión y depresión mental; reacción alérgica (rash cutáneo); problemas de comportamiento, alteraciones sanguíneas caracterizadas por escalofríos, fiebre, dolor de garganta, hematomas; latidos cardíacos irregulares; pérdida de memoria; alucinaciones; aparición de coloración amarilla en ojos o piel; cambios de comportamiento; agresividad; necesidad de incrementar la dosis.

Precauciones:

Evitar su uso en el embarazo y durante el período de lactancia. Reducir las dosis en pacientes ancianos o debilitados o en personas que padecen de insuficiencia renal, hepática o respiratoria.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- De 1 a 2 mg (1/2 comprimido a 1 comprimido) antes de dormir. Algunos pacientes responden adecuadamente con 0,5 mg.
- Ancianos, enfermos debilitados, o enfermos renales o hepáticos, dar la mitad de estas dosis.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral con un vaso de líquido o con alimentos. Tomar la dosis al acostarse.

Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas.

Sobredosis:

Síntomas de sobredosis son: Confusión continua, reflejos disminuidos, somnolencia intensa; temblores, latidos cardíacos lentos, sensación de falta de aire o respiración dificultosa. En caso de aparición de síntomas de sobredosis, trasladar al paciente a un centro asistencial para su tratamiento.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor y humedad. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.