

Adroxef®
Cefadroxilo
Polvo para suspensión oral 250mg/5ml

Composición y presentación:

Cada 5 mL de suspensión reconstituido contiene:

Cefadroxilo 250 mg (como monohidrato)

Excipientes: Colorante FD&C rojo N° AO, esencia de fresa, esencia de damasco, benzoato de sodio, nitrato de sodio dihidrato, goma xantán, ácido cítrico anhidro, celulosa microcristalina y carboximetilcelulosa sódica, sacarosa.

Clasificación:

Antibiótico.

¿Para qué se usa?:

Este medicamento está indicado en el tratamiento de infecciones del tracto urinario, piel, tejidos blandos y tracto respiratorio alto, causadas por microorganismos sensibles.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

Administración:

Vía Oral.

Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Niños mayores de 1 año hasta 12 años:** 15 - 25 mg/kg de peso corporal cada 12 horas.

- **Infecciones de piel y tejidos blandos:** 15mg/kg cada 12 horas.

- **Faringitis, tonsilitis:** 15 mg/kg cada 12 horas o 30 mg/kg peso una vez al día por 10 días.

- **Infección del tracto urinario:** 15 mg/kg cada 12 horas por 10 días.

- **Adolescentes y adultos:** 500 mg a 1 g cada 12 horas.

Modo de uso:

Administrar con una medida graduada de 5 mL y en la forma indicada por el médico.

La duración del tratamiento la determinara su médico de acuerdo a la infección que usted presente.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios.

Si no cumple el tratamiento lo mas probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

Consejo de cómo administrarlo

Lo puede tomar antes, durante y después de las comidas, sin problemas. No obstante, si presenta problemas estomacales prefiera su administración junto con las comidas.

Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis. Si utiliza el medicamento por más tiempo que el indicado por su médico puede provocar efectos adversos u otro tipo de infecciones.

Precauciones:**Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con cefadroxilo.

Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con ese medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de cefadroxilo.

Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

Embarazo

Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

Lactantes y niños

Este medicamento puede ser utilizado por niños mayores de 1 año. El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

Precauciones especiales

Si ha tenido colitis ulcerosa, enteritis regional o colitis asociada a antibióticos deberá estar especialmente bajo control médico mientras toma este medicamento.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico. Precaución en diabéticos: Contiene azúcar.

Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a cefadroxilo o a otros antibióticos.

Interacciones:**Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: carbenicilina, heparina, warfarina, sulfpirazona, dipiridamol, pentoxifilina, plicampicina, ticarcilina, probenecid, ácido valproico.

Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de colitis.

Exámenes de laboratorio

Cefadroxilo puede alterar los resultados de algunas pruebas de laboratorio como creatinina en sangre o glucosa en orina, por lo que si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

Efectos adversos:

Existen efectos que se presentan raro vez pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, confusión, escalofríos,

hinchazón de la cara o garganta, dolor de cabeza en presencia de luz, sudoración, severo dolor estomacal y calambres, fiebre, diarrea con sangre.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea suave, calambres estomacales, dolor en la boca o lengua, picazón o descarga vaginal.

Sobredosis:

Los síntomas de sobredosis corresponden o una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: dolor abdominal severo, diarrea con sangre, vómitos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarlo adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

Condiciones de almacenamiento:

No dejar al alcance de los niños. Mantener el polvo en su envase original protegido del calor y la humedad. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Una vez preparada la suspensión, tiene una duración de 14 días en refrigeración entre 2 - 8°C sin congelar.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.