

Hiedrix

Jarabe 35 mg/5 ml

Composición y presentación:

Cada 100 mL de jarabe contiene:

Extracto seco de hojas de Hedera Helix L. (5-7,5:1) 0,700 g (equivalente a 70 mg de hederacósido C)

Excipientes: Sorbitol, sorbato de potasio, goma xantano, esencia líquida de menta y esencia líquida de miel, agua purificada. Sin alcohol, azúcar ni colorantes.

Clasificación:

Expectorante – Espasmolítico.

Indicación:

Tratamiento de los síntomas de enfermedades bronquiales inflamatorias, acompañadas de tos.

Advertencias:

- Este medicamento no debe ser usado más de 15 días. Si no ceden los síntomas, consulte al médico.
- En niños de 2-4 años debe emplearse bajo supervisión médica.
- Si tiene alguna duda en el uso de este producto, consulte al químico farmacéutico o al profesional de salud más cercano.
- En caso de alergias, Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos. Si el consumo de este medicamento le produce reacción alérgica, suspenda el tratamiento y consulte al médico.
- La administración del medicamento a los niños debe ser efectuada por un adulto responsable.

Contraindicaciones:

- No administrar a niños menores de 2 años, ni a mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- No administrar en casos de antecedentes de alergia o hipersensibilidad a alguno de los componentes de esta formulación.

Efectos adversos:

- Aunque los efectos secundarios de este medicamento no son comunes, en individuos sensibles a alguno de sus componentes, podrían llegar a presentarse malestares gastrointestinales (como náuseas, vómitos o diarrea ligera) o reacciones alérgicas.
- En casos raros puede tener un efecto laxante, debido al contenido de sorbitol presente en este producto.

Interacciones:

- El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros, Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta antes de usar este fármaco.
- Hasta la fecha no se han descrito interacciones en el caso de ingestión simultánea de este producto con otros medicamentos.

Sobredosis:

- **Síntomas:** En general es bien tolerado y prácticamente no presenta reacciones adversas. En ciertas condiciones, podría manifestarse un leve efecto laxante.
- **Tratamiento:** Si aparecieran síntomas molestos, el paciente debe suspender la administración y consultar al médico o acudir a un centro asistencial.

Dosis:

- En niños de 2 a 4 años el médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado con este medicamento, no obstante la dosis usual recomendada es: 2,5 mL de jarabe 3 veces al día.
- **Niños de 4 y más años:** 5 mL de jarabe 3 veces al día.
- **Adultos:** 5 mL de jarabe 3 a 5 veces al día.

Duración del tratamiento:

La duración del tratamiento depende del tipo y de la severidad del cuadro clínico; de todos modos, el tratamiento debe durar como mínimo una semana aún en el caso de inflamaciones menores del tracto respiratorio. El tratamiento con Hiedrix Jarabe debe mantenerse durante 2-3 días una vez que los síntomas han disminuido, con el fin de asegurar el éxito duradero del tratamiento. No debe administrarse por más de 15 días consecutivos, a menos que el médico así lo indique. En caso de malestares persistentes o de aparición de insuficiencia respiratoria (dificultad para respirar), fiebre o también expectoración purulenta o con sangre, se debe consultar con el médico de inmediato.

Administración:

Vía oral.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original a temperaturas inferiores a 30°C, protegido del calor. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.