

Lactil

Cápsulas

Composición y presentación:

Cada cápsula contiene:

Lactobacillus casei variedad rhamnosus como polvo liofilizado 250,0 mg, equivalente a 8×10^8 gérmenes vivos/gramo

Excipientes: Estearato de magnesio, dióxido de titanio.

Envase con 12 cápsulas.

Vía de Administración:

Oral.

Clasificación:

Restaurador de la flora intestinal.

Indicaciones:

Lactil se usa para la prevención y tratamiento sintomático de enfermedades diarreicas de diferente etiología, como complemento de la rehidratación.

Precauciones y advertencias:

En niños menores de 2 años, todas las diarreas pueden ser graves, por lo que se hace necesario consultar siempre al médico.

En niños mayores: Si la diarrea persiste por más de dos días, consultar con el médico ya que puede ser necesario iniciar un tratamiento de rehidratación.

En casos de diarreas severas y deposiciones con sangre o mucus, o con fiebre y vómitos consultar con el médico y en el intertanto, suministrar soluciones de sales de rehidratación para prevenir la deshidratación. La deshidratación se manifiesta en los niños por pérdida de peso, decaimiento, piel reseca y llanto sin lágrimas, lo que indica que se debe acudir a un establecimiento de urgencia.

No es necesaria su adaptación posológica en caso de insuficiencia renal o hepática, ni en personas de edad.

Contraindicaciones:

No tome este medicamento si Ud. ha sufrido anteriormente de reacciones alérgicas con este producto; si estas manifestaciones aparecen durante el tratamiento, suspender el medicamento y consultar con el médico.

No tome este medicamento por más de 2 días sin indicación del médico; si los síntomas persisten o empeoran, consultar al médico.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse cuando se administra junto con otros. Informe a su médico o al farmacéutico acerca de todos los medicamentos que está usando.

Efectos adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir también algunos efectos no deseados, que desaparecen espontáneamente y que normalmente, no requieren atención médica: Molestias gastrointestinales (incremento de gases intestinales), reacciones alérgicas leves.

Modo de administración y dosis:

Las cápsulas se pueden tomar con un vaso de agua fría.

- **Dosis:** La que su médico le indique. Las dosis recomendadas para adultos y para niños son de 2 a 8 cápsulas en el día. Tomar de preferencia en horarios alejados de las comidas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos de alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Asegúrese que al eliminar el medicamento, no será encontrado y usado por los niños.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.