

Lodipres® 25 mg

Comprimidos

Carvedilol

Composición y presentación:

Cada comprimido contiene:

Carvedilol 25 mg

Excipientes: Lactosa monohidrato, colorante FD&C azul N°1, lacado, almidón de maíz, povidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa microcristalina.

Clasificación:

Antihipertensivo. Beta-bloqueador no selectivo y bloqueador alfa-1.

Indicación:

Tratamiento de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca congestiva compensada.

Advertencias:

Use este medicamento sólo por indicación y supervisión médica.

En pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente y que requieran de anestesia general, se puede presentar depresión cardíaca. En pacientes con diabetes mellitus puede enmascarar los síntomas característicos de un cuadro de hipoglicemia aguda (aumento de la frecuencia cardíaca) y retrasar la normalización de ella. Asimismo, puede enmascarar ciertos signos de la actividad excesiva de la glándula tiroides.

Contraindicaciones:

Está contraindicado en pacientes con: Hipersensibilidad a Carvedilol, enfermedad broncopulmonar obstructiva como asma crónica, bronquitis obstructiva, en trastornos cardiológicos graves, pacientes con disminución severa de la frecuencia cardíaca y pacientes con insuficiencia hepática.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos:

- **Anestésicos administrados por inhalación:** Eter etílico, Ciclopropano, Cloroformo, Metoxiflurano y Tricloroetileno.
- Otros antihipertensivos.
- Digoxina y Digitoxina,
- Antidiabéticos orales e insulina.
- Rifampicina y Cimetidina.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren de atención médica: Ocasionalmente, vértigo, dolor de cabeza y cansancio (más frecuentes al comienzo del tratamiento). También se han observado alteraciones gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento.

Reacciones adversas:

Si usted presenta algunas de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto consulte a su médico:

- **Alteraciones cardiocirculatorias:** disminución de la frecuencia cardíaca, síncope, bloqueo atrioventricular, insuficiencia cardíaca, hipotensión ortostática (especialmente después de la primera dosis, en ancianos), además de broncoespasmo y disnea.

- Excepcionalmente, depresión mental, impotencia, elevación de las transaminasas, trombocitopenia, leucopenia, parestesias, enfriamiento de extremidades y erupciones exantemáticas.

Precauciones:

Pacientes con obstrucción bronquial, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, enfermedad vascular periférica y feocromocitoma, pueden presentar complicaciones de su enfermedad. En pacientes geriátricos puede provocar mareos o desmayos al ponerse de pie. No suspenda el tratamiento sin antes consultarlo con su médico.

- **Embarazo:** Se deben evaluar los riesgos y beneficios para la madre y el feto.

- **Lactancia:** Su seguridad no ha sido establecida.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Tratamiento de la hipertensión:** Dosis inicial de 12,5 mg, una vez al día por 2 días; luego aumentar a 25 mg diarios y si es necesario, después de 2 semanas, aumentar la dosis a 50 mg diarios.

- **En pacientes con disfunción cardíaca congestiva compensada:** Se recomienda iniciar el tratamiento con 6,25 mg, dos veces al día e ir aumentando gradualmente hasta llegar a una dosis de mantención de 25 mg, dos veces al día.

Modo de empleo:

Tomar los comprimidos, vía oral, al acostarse con un vaso de agua.

Sobredosis:

- **Síntomas:** Hipotensión severa, disminución de la frecuencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico y paro cardíaco. También podrían presentarse problemas respiratorios, broncoespasmos, vómito, pérdida del conocimiento y ataque generalizado (convulsiones).

- **Tratamiento:** Se debe colocar al paciente en posición acostada, para mejorar el flujo de sangre al cerebro. Trasladar rápidamente al paciente a un centro asistencial para el tratamiento sintomático y monitoreo de la función cardiorrespiratoria. Llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, protegido del calor, la humedad y fuera del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.