

Mebendazol

Suspensión oral 100 mg/5 ml

Composición y presentación:

Cada 5 mL de suspensión contienen:

Mebendazol 100 mg

Excipientes: Sacarina sódica, celulosa microcristalina carmelosa sódica, metilparabeno, propilparabeno, sodio lauril sulfato, fosfato de potasio monobásico, fosfato de sodio dibásico, colorante FD&C rojo N° 40, esencia de fresa, agua purificada.

Clasificación:

Antihelmíntico.

Indicaciones:

Oxiuriasis o pidulles. Ascaris o lombrices y otros parásitos intestinales como: Trichiuria, Uncinaria y Anquilostomas.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

Contraindicaciones:

No usar en caso de embarazo. Niños menores de 2 años. Hipersensibilidad al mebendazol o a otros medicamentos de la familia de los imidazólicos.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con Carbamazepina, Cimetidina.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: Trastornos gastrointestinales (dolor o molestias abdominales, diarrea, náuseas o vómitos), en raras ocasiones se han descrito casos de alopecia (caída del pelo), mareos y dolor de cabeza.

Reacciones adversas:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto acuda a su médico: Reacciones de hipersensibilidad (fiebre, enrojecimiento y/o picazón), neutropenia (dolor de garganta, fiebre, cansancio y debilidad).

Precauciones:

Utilizar con precaución en personas con insuficiencia hepática, colitis ulcerosa.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento apropiado a su caso en particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Oxiuros en adultos y niños:** 100 mg; dosis única.

- **Ascaris y otros, en adultos y niños:** 100 mg cada 12 horas, por 3 días.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral. Cumplir el ciclo completo del tratamiento; en infecciones severas se puede necesitar un segundo ciclo de tratamiento. En el caso de Oxiuros (pidulles) se debe tratar a todos los miembros de la familia simultáneamente y repetir el proceso después de 2 a 3 semanas. Lavar (sin sacudir) toda la ropa de cama y las prendas de dormir, para evitar la reinfección.

Sobredosis:

En la sobredosis accidental se pueden producir síntomas gastrointestinales que pueden durar hasta varias horas.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase y/o el folleto del medicamento que se ha tomado.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.