

Neomicina

Comprimidos 500 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido contiene:

Neomicina 500 mg

Excipientes: Polividona, celulosa microcristalina, magnesio estearato.

Indicaciones:

La Neomicina se usa para reducir la carga bacteriana intestinal, previo a cirugía del intestino y en casos de insuficiencia hepática para evitar la encefalopatía.

Clasificación:

Antibiótico. Aminoglucósido.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

Contraindicaciones:

No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la Neomicina u otros antibióticos aminoglucósidos tales como: Gentamicina, estreptomina, Amikacina o tobramicina.

Contraindicado en obstrucción intestinal o insuficiencia renal.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Furosemida, Amfotericina B, Cisplatino, aciclovir, bacitracina, cefalosporina, polimixina B, vancomicina.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: Aumento de la sed, pérdida del apetito, náuseas y vómitos.

Reacciones adversas:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, consulte a su médico: náuseas y vómitos intensos, gran aumento o disminución de la frecuencia urinaria o del volumen de orina.

Contracciones musculares, entumecimiento, convulsiones, hormigueo. Cualquier grado de pérdida de audición, sensación de taponamiento en los oídos, inestabilidad y mareos; dificultad al respirar, debilitamiento, diarrea, incremento de gas, espuma, eliminación grasa; rash cutáneo, irritación o dolor del área rectal.

Precauciones:

No administrar a mujeres embarazadas y durante el período de amamantamiento. Emplear con precaución en pacientes geriátricos. Puede interferir con resultados de exámenes de laboratorio. Administrar con precaución en pacientes con disfunción renal, parkinsonismo o Miastenia gravis.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es:

- **Niños:** 50 mg/Kg/día.

- **Adultos:** 1 g (2 comprimidos) cada 4 horas por 2 o 3 días.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral, con un vaso de agua.

Sobredosis:

En caso de presentar una exacerbación de las reacciones adversas, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial, para un tratamiento sintomático y de mantención adecuado. Llevar este folleto informativo.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.