

Nicergolina

Comprimidos recubiertos 15 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido recubierto contiene:

Nicergolina 15 mg

Excipientes: Celulosa microcristalina, sodio almidón glicolato, magnesio estearato, calcio fosfato, recubrimiento polimérico, talco, titanio dióxido, colorante FD&C amarillo N°5, macrogol.

Indicaciones:

Accidente vascular isquémico. Demencia aterosclerótica. Pérdida de la memoria, disminución de la concentración y rendimiento intelectual, desorientación, falta de cuidado personal.

Clasificación:

Vasodilatador cerebral y periférico.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

Contraindicaciones:

No usar en caso de hipersensibilidad al fármaco.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Nicergolina aumenta el efecto de los medicamentos para la hipertensión arterial. Puede acentuar el efecto de propranolol disminuyendo el ritmo cardíaco.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: Cefalea, zumbido de oídos, náuseas, rubicundez facial.

Reacciones adversas:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto y/o si presenta algún otro efecto o síntoma no descrito en este folleto consulte a su médico: Hipotensión ortostática (sensación de mareo o aturdimiento al incorporarse desde una posición en reposo). Pérdida del control del equilibrio.

Precauciones:

Puede potenciar el efecto de fármacos hipotensores, por lo que es aconsejable ajustar la dosis de los fármacos hipotensores. Este producto contiene tartrazina, precaución en pacientes alérgicos a este colorante.

Dosis:

Adultos: 15-30 mg/día. Oral: c/6-8 horas.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral. Tomar los comprimidos con un vaso de agua.

Sobredosis:

No se han reportado. Si se sospecha de sobredosis, acudir a un centro asistencial, en donde se realizará un tratamiento sintomático y de mantención. Llevar este folleto informativo.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor y la humedad.
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.