

Nifedipino

Comprimidos recubiertos de liberación prolongada 20 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido recubierto de liberación prolongada contiene:

Nifedipino 20 mg

Excipientes: Lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, sodio almidón glicolato, polividona, magnesio estearato, hipromelosa, macrogol, talco, titanio dióxido, colorante FD&C amarillo N°5, lacado, colorante FD&C amarillo N°6, lacado, simeticona, poliacrilatos dispersión.

Indicaciones:

Prevención y tratamiento de la angina de pecho (Dolor de pecho). Hipertensión arterial.

Clasificación:

Antianginoso, Antihipertensivo.

Advertencias y precauciones:

Antes de usar este medicamento se deben sopesar los riesgos y los beneficios de su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente se deben considerar los aspectos siguientes:

Alergias

Ud. debe comunicar a su médico si anteriormente ha presentado alguna reacción alérgica a este medicamento o a otras sustancias, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.

Embarazo

Ud. debe informar al médico si está embarazada o planea estarlo. Administrar con precaución en mujeres embarazadas. Puede afectar el desarrollo del feto y retardar el parto.

Lactancia

Debe consultar con el médico sobre la conveniencia de tomar este medicamento mientras está amamantando.

Niños

Usualmente, los niños son mas sensibles que los adultos a los efectos de este producto. Los efectos adversos descritos para adultos, pueden presentarse con mayor probabilidad en los niños.

Ancianos

Los ancianos son mas sensibles que los adultos jóvenes a los efectos de este producto y puede que requieran dosis iniciales mas reducidas. Los efectos adversos pueden presentarse con mayor probabilidad en los ancianos.

Medidas dietéticas

Junto con el tratamiento, el médico le va a indicar una restricción en el consumo de sal y reducción de peso junto con cierta actividad física adecuada a su condición.

Controles periódicos

Acuda regularmente al médico; recuerde que este medicamento sólo mantiene bajo control la alta presión y deberá tomarlo de por vida.

Úsese sólo por indicación y bajo control del médico. Puede producir hipotensión y retardar los latidos cardiacos; al inicio del tratamiento se puede desencadenar ataque pasajeros de angina.

Administrar con cuidado en casos de hipotensión, ritmo cardíaco lento, insuficiencia renal o hepática, insuficiencia cardíaca congestiva.

Nifedipino 20 mg contiene tartrazina, precaución en pacientes alérgicos a este colorante.

Presencia de otras enfermedades y contraindicaciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de alguna enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, que pueden llegar a ser severos.

Ud. debe comunicar al médico si padece alguna enfermedad, o si la ha padecido anteriormente, como ser: Insuficiencia cardíaca o alteraciones del ritmo, trastornos circulatorios. Enfermedad del hígado o del riñón.

No usar en personas con presión arterial baja (hipotensión arterial) o en infarto agudo del miocardio.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse cuando se administra junto con otros (Interacciones) Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta.

Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: Cimetidina, Digoxina, Betabloqueadores (Propranolol, Atenolol, Acebutolol), Insulina, Tolbutamida, Teofilina, Fenitoína, Carbamazepina y diuréticos. Medicamentos antigripales descongestionantes.

Efectos adversos:

Los medicamentos pueden provocar algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Consulte inmediatamente al médico si presenta alguno de los síntomas siguientes:

Hipotensión ortostática (sensación de mareo o desmayo al incorporarse desde una posición en reposo). Retención de líquido con hinchazón de tobillos y piernas (edema), latidos cardíacos irregulares. Ronchas, urticaria, dificultad para respirar.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante, si continúan o se intensifican, debe comunicarlo al médico. Cefalea, zumbido de oídos, náuseas, enrojecimiento y calor facial, mareos pasajeros.

Forma de administración y dosis:

Tome este medicamento sólo en la forma indicada por el médico; no lo tome en mayor cantidad ni con mayor frecuencia o por mayor tiempo que el ordenado por el médico.

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular; no obstante, las dosis usuales recomendadas son:

- **Adultos:** Nifedipino 20 mg (Liberación prolongada) un comprimido dos veces al día.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral. Ingerir los comprimidos de liberación prolongada enteros, con un vaso de alimento líquido; no romperlos o triturarlos ni masticarlos.

Sobredosis:

Síntomas de sobredosis: hipotensión o presión arterial baja, latidos cardíacos rápidos o lentos. El tratamiento de la sobredosis es sintomático y de mantención, se debe realizar en un centro asistencial de urgencia.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.