

# **Omeprazol**

## **Cápsulas con gránulos con recubrimiento entérico 20 mg**

### **Composición y presentación:**

Cada cápsula con gránulos con recubrimiento entérico contiene:

Omeprazol 20 mg

Excipientes: Manitol, Sacarosa, hipromelosa, lauril sulfato de sodio, fosfato de sodio dibásico, alcohol cetílico, dióxido de titanio, polividona, carbonato de calcio, colorante FD&C azul N° 1, colorante FD&C amarillo N° 5.

### **Clasificación:**

Antiulceroso.

### **¿Para qué se usa?:**

Este medicamento está indicado en el tratamiento de:

- Úlcera duodenal.
- Úlcera gástrica.
- Erradicación de helicobacter pylori asociado a la enfermedad ulcerosa péptica en terapia combinada con antibacterianos.
- Esofagitis por reflujo.
- Enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática.
- Síndrome de Zollinger-Ellison.

### **Administración (oral):**

#### **Rango y frecuencia**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos:

- Úlcera duodenal: 20 mg una vez al día por 4 semanas
- Úlcera gástrica: 40 mg una vez al día por 4 a 8 semanas
- Erradicación de helicobacter pylori: Se recomienda iniciar la terapia con omeprazol 20 mg dos veces al día o 40 mg una vez al día en combinación con antibióticos, luego se recomienda seguir la terapia con 20 mg de omeprazol por 18 días en los pacientes que padecen de úlcera duodenal activa.
- Esofagitis activa: 20 mg. una vez al día por 4 a 8 semanas
- Enfermedad por reflujo gastroesofágico: 20 mg. al día por 4 semanas.
- Estados de hipersecreción como síndrome de Zollinger -Ellison: 60 mg una vez al día, en caso que se necesiten dosis mayores a 80 mg al día, éstas deben ser dadas en dosis divididas.

#### **Consejo de cómo administrarlo**

Debe tomarlo antes de las comidas, acompañado con un vaso de agua.

#### **Uso prolongado**

No debe utilizar este medicamento en forma indefinida, su médico le indicará por cuanto tiempo debe seguir el tratamiento.

### **Precauciones:**

#### **Mayores de 60 años**

Las reacciones adversas pueden ser más comunes y más severas en pacientes ancianos.

#### **Consumo de alcohol**

Evite el consumo de alcohol, ya que este puede aumentar las molestias estomacales.

#### **Manejo de vehículos**

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento

sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

### **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe señalar al médico, que está embarazada o puede estarlo, antes de usar este medicamento.

### **Lactancia**

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

### **Lactantes y niños**

En niños, sólo debe utilizarlo por indicación de su pediatra, quien debe evaluar el riesgo/beneficio de su administración.

### **Precauciones especiales**

Si tiene problemas para tragar, puede abrir las cápsulas y disolver su contenido en un líquido ligeramente ácido (por ejemplo: jugo de naranja), se debe tomar 30 minutos, antes de las comidas. Utilice este medicamento por todo el tiempo que su médico se lo indicó aunque siente que los síntomas han desaparecido.

Evite el cigarrillo, ya que éste junto al alcohol aumentan la acidez estomacal y pueden afectar la acción del medicamento.

### **Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia al omeprazol, pantoprazol, rabeprazol o lansoprazol.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

### **Interacciones:**

#### **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: diazepam, alprazolam, carbamazepina, ciclosporina, digoxina, disulfiram, fenitoína, metotrexato, warfarina, cianocobalamina, ketoconazol y prednisolona.

#### **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular, problemas a la sangre o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

#### **Exámenes de laboratorio**

Este medicamento puede alterar los resultados de los análisis de transaminasas hepáticas en sangre, por lo que debe informar que esta utilizando este medicamento, antes de hacerse este examen de sangre.

### **Efectos adversos:**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: sangrado o contusión poco usual, piel y ojos amarillos, llagas en la boca, erupción de la piel, picazón, hinchazón, fiebre, dificultad para respirar.

#### **- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: estreñimiento leve, diarrea leve, gases, mareos, dolor de cabeza, náuseas, vértigo y dolor muscular.

### **Sobredosis:**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: visión borrosa, confusión, mareos, sequedad de boca, dolor de cabeza, náuseas, palpitaciones, inusual aumento del ritmo del corazón. Debe recurrir a un centro asistencial para

evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener en su envase original; protegido del calor, luz, humedad y fuera del alcance de los niños.  
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.