

Paracetamol infantil Comprimidos 80 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido contiene:

Paracetamol 80 mg (Acetaminofeno)

Excipientes: Manitol, polividona, aspartamo, colorante D&C rojo N° 27 lacado, esencia de cerezas, talco, celulosa microcristalina, almidón glicolato de sodio, magnesio estearato.

Indicaciones:

Este medicamento se usa para tratar la fiebre y los dolores suaves a moderados. Este medicamento provee alivio temporal a los síntomas descritos, pero en ningún caso resuelve el origen de ellos.

Clasificación:

Analgésico-Antipirético.

Advertencias y precauciones:

No administrar por más de 5 días en caso de dolor, por más de 3 días en caso de fiebre, o por más de 2 días en caso de dolor de garganta, sin consultar al médico.

El uso prolongado y de altas dosis de paracetamol, puede provocar severo daño hepático. Como todo medicamento, manténgase fuera del alcance de los niños. No sobrepasar las dosis recomendadas.

La administración de medicamentos a los niños debe hacerla un adulto responsable.

Contiene aspartamo, no administrar a personas que padecen fenilcetonuria.

Paracetamol es un medicamento que se encuentra solo o en combinación con otros principios activos, en productos destinados al tratamiento de resfrío, tos, alergia, entre otros. Algunos de estos productos pueden venderse libremente y otros requieren receta médica. Paracetamol puede causar, aunque con poca frecuencia, reacciones graves a la piel, que pueden manifestarse con enrojecimiento, erupción cutánea, ampollas y daños en la superficie de la piel. Si usted desarrolla erupción cutánea u otra reacción a la piel mientras usa paracetamol, deje de tomarlo y acuda al médico inmediatamente.

Si ya ha tenido reacciones a la piel con paracetamol, no tome medicamentos que lo contengan.

Paracetamol puede causar, en dosis superiores a las habituales, graves daños al hígado, que se pueden manifestar con síntomas como fatiga inusual, anorexia, náuseas y/o vómitos, dolor abdominal, ictericia (coloración amarilla de piel y/o de la zona blanca de los ojos), orina oscura o deposiciones blanquecinas.

En caso de presentar alguno de estos síntomas, suspenda el uso del medicamento y acuda al médico.

Es importante mantener este medicamento lejos del alcance de los niños y de personas con tendencias suicidas y acudir por ayuda médica inmediatamente si se ha ingerido una cantidad significativamente superior a la habitual (el doble de la dosis diaria normal o más).

Contraindicaciones:

Si su médico no ha dispuesto otra cosa, no se debe administrar este medicamento en las siguientes condiciones:

- Hepatitis, daño hepático o renal severo.
- Alergia al paracetamol, ácido acetilsalicílico o a algún componente de la fórmula.
- Una administración repetida está contraindicada en pacientes con anemia, enfermedad cardíaca o pulmonar grave.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que el niño está usando, incluyendo aquellos que se han adquirido sin receta.

Sin conocimiento del médico, no debe administrar conjuntamente con: Dipirona, ácido acetilsalicílico, otros analgésicos o antiinflamatorios como, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etc.

Se han descrito interacciones con los siguientes productos:

- Fenotiazinas (un tipo de tranquilizante).
- Antipiréticos (medicamentos para bajar la temperatura).
- Su uso con anticoagulantes y fenilhidantoína, puede potenciar los efectos anticoagulantes.
- Puede inducir mayores concentraciones de cloranfenicol en la sangre.

En caso de requerir atención médica por otras razones, no olvide mencionar que está tomando este medicamento.

Efectos adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener.

Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Consulte inmediatamente al médico si el menor presenta algunos de los siguientes síntomas:

- Ojos o piel amarilla, náuseas, vómitos.
- Dificultad para respirar, sudoración, orina coloreada o turbia.
- Manchas o prurito (picazón) o moretones en la piel.
- Palidez o debilidad.
- Dolor de tipo renal.
- Disminución de la cantidad de orina.
- Orina oscura o con sangre.
- Sangramiento inusual, deposiciones negras alquitranadas o con sangre.

Cualquier otra reacción no mencionada que Ud. considere extraña, importante o molesta en el niño.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento).

No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico.

Modo de uso y dosis:

Vía oral, el comprimido puede tomarse con agua o jugo. La dosis a administrar en niños es por kilo de peso corporal, 10 a 15 mg por kilo de peso, la que debe ser administrada hasta 4 veces al día, con una dosis máxima diaria de 60 mg por kilo de peso, no se deben sobrepasar las dosis máximas diarias (en 24 horas).

Ver la siguiente tabla:

Edad (años)	Dosis máxima diaria
2 a 4	720 mg
4 a 6	960 mg
6 a 9	1.260 mg
9 a 11	1.740 mg
11 a 12	2.160 mg

Las dosis a menores de 2 años deben ser consultadas al médico.

Sobredosis:

La intoxicación aguda (ingesta masiva del medicamento) se puede manifestar en algunos casos a las pocas horas con vómitos, náuseas, falta de apetito, dolor estomacal. Puede además presentarse salivación profusa. En otros casos la sobredosis puede presentarse sin síntomas. Los signos de toxicidad hepática aparecen entre 2 a 4 días después. En caso de sobredosis, existiendo o no síntomas, acuda inmediatamente a un centro asistencial.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, protegido del calor, humedad y fuera del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin antes consultar con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.