

## **Pentoxifilina**

### **Comprimidos recubiertos de liberación prolongada 400 mg**

#### **Composición y presentación:**

Cada comprimido recubierto de liberación prolongada contiene:

Pentoxifilina 400 mg

Excipientes: Hidroxietilcelulosa, polivinilpirrolidona, dióxido silícico coloidal, magnesio estearato, lactosa monohidrato de compresión directa, polímero neutro de poliacrilatos y polimetacrilatos, polietilenglicol 6000, hidroxipropilmetilcelulosa, talco, titanio dióxido, simeticona al 30%, colorante rojo D&C N° 27, lacado.

#### **Clasificación:**

Estimulante circulatorio.

#### **Indicaciones:**

Enfermedades oclusivas de las arterias periféricas de las extremidades (claudicación intermitente) y alteraciones circulatorias de origen ateroeclerótico, diabético, inflamatorio o funcional; úlceras tróficas (relativo a los tejidos).

#### **Advertencias:**

Úsese sólo por indicación médica, los resultados de la medicación se pueden apreciar sólo después de algunas semanas de tratamiento.

#### **Contraindicaciones:**

No usar dosis elevadas en personas que presenten arritmias. Contraindicado en personas alérgicas a la droga o a otras metilxantinas (cafeína, aminofilina).

#### **Interacciones:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con: Anticoagulantes (acenocumarol, fenilindandiona, heparina), cefoperazona, ácido valproico, antihipertensivos, cimetidina, tabaco.

#### **Reacciones adversas:**

El uso de este medicamento puede producir algunos efectos adversos: mareos, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, molestias gástricas.

Si usted presenta reacciones adversas de cuidado, mientras esté en tratamiento con este producto, acuda a su médico: arritmias (latidos cardíacos irregulares), dolor en el pecho.

#### **Precauciones:**

Abstenerse de fumar durante el tratamiento (la nicotina por su acción vasoconstrictora se opone a la acción vasodilatadora de la pentoxifilina). Consultar al médico antes de suspender la medicación, que puede tardar varias semanas en surtir efecto.

#### **Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento apropiado a su caso en particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Adultos:** 400 mg; 2 o 3 veces al día.

El tratamiento debe durar al menos, ocho semanas.

#### **Modo de empleo:**

Administrar por vía oral, en lo posible con las comidas para reducir la irritación gástrica. Ingerir los comprimidos enteros, no masticarlos, ni triturarlos.

**Sobredosis:**

**Síntomas de sobredosis:** Exacerbación de los efectos adversos con alteraciones a nivel del sistema nervioso central (somnolencia, sofocos, desmayos, excitación, convulsiones) o gastrointestinal, si se presentan estos síntomas, se debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original, protegido del calor y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.