

Sertralina 100 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido contiene:

Sertralina (como clorhidrato) 100 mg

Excipientes: Celulosa microcristalina, polisorbato, sodio almidón glicolato, Colorante FD&C Amarillo N° 5, lacado, polividona, magnesio estearato.

Indicaciones:

Tratamiento de los síntomas de la depresión acompañada por síntomas de ansiedad en pacientes con o sin historia de manía; tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo (toc); tratamiento del trastorno de pánico con o sin agorafobia; tratamiento del trastorno de estrés post traumático (tept); tratamiento de la fobia socia también conocida como trastorno de ansiedad social; tratamiento disfórico premenstrual.

Clasificación:

Antidepresivo.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Evitar discontinuar el medicamento en forma repentina. Las personas que deben conducir vehículos u operar maquinarias que requieren estado de alerta, ser prevenidos que pueden sufrir somnolencia y perder habilidades motoras.

Contraindicaciones:

No usar en personas con hipersensibilidad conocida al medicamento. En la fase maníaca de la depresión maniaco-depresiva.

- **Embarazo:** No se recomienda su uso en el embarazo o lactancia.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta.

Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Anticoagulantes, Sales de Litio, Inhibidores I-MAO (Furazolidona, Selegilina), Antidepresivos, Antidiabéticos, Alcohol, Triptófano. No se recomienda su asociación con estos productos sin supervisión médica.

Reacciones adversas o efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir algunos efectos que normalmente no requieren atención médica: Disminución del apetito o pérdida de peso; disminución de la capacidad o del deseo sexual; diarrea, mareos, somnolencia, sequedad de la boca (consultar al médico si la sequedad persiste por más de 2 semanas).

Si se presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto consulte a su médico: Sudoración, problemas para dormir, calambres, cansancio o debilidad, temblores, ansiedad, agitación, nerviosismo o inquietud. Estos efectos secundarios pueden estar relacionados con la dosis y con el tiempo de empleo de este medicamento.

Precauciones:

No existen estudios sobre el uso de sertralina en embarazadas. No se recomienda su uso en mujeres durante el período de lactancia. Usar con precaución en enfermos con disfunción hepática y/o renal. Emplear con suma precaución en personas con antecedentes de abuso o dependencia de drogas. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, no tomar otros depresores del sistema nervioso central a menos que el médico lo indique. Este medicamento puede producir somnolencia, alteración del raciocinio o del pensamiento; precaución en personas que conducen vehículos o que realicen trabajos que requieran un especial estado de alerta.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Dosis usual sugerida en adultos

- En Depresión general y Desórdenes Obsesivo-Compulsivos: Inicialmente 50 mg al día como dosis única en la mañana o en la noche. La dosis puede ser aumentada después de algunas semanas en incrementos de 50 mg, a intervalos de al menos una semana, según necesidad y tolerancia o como lo indique su médico.
- Crisis de Pánico: Inicialmente, dar 25 mg una vez al día; después de una semana se puede incrementar a 50 mg al día.
- Prescripción límite usual en adultos: 200 mg (base) al día.

Dosis usual sugerida en mayores de 65 años

- Inicialmente 12,5 a 25 mg (base) al día, como dosis única en la mañana o en la noche; la dosis puede ser aumentada gradualmente según necesidad y tolerancia o como lo indique su médico.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral, con abundante agua. Para aliviar la sequedad de la boca, utilizar caramelos o chicles sin azúcar o simplemente hielo.

Sobredosis:

No existe antídoto específico para el tratamiento de sobredosis por sertralina. Por lo que el tratamiento es sintomático y de mantención y para tal efecto, el enfermo deberá ser trasladado a un centro asistencial de urgencia. Se deberá tener un buen control de las vías aéreas, controlar la función cardíaca, posiblemente se le pueda inducir el vómito o realizar un lavado gástrico.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Almacenar a temperatura ambiente, menor a 30°C.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.