

## **Tolnaftato**

### **Solución tópica 1%**

#### **Composición y presentación:**

Cada 100 ml de solución contiene:

Tolnaftato 1,00 g

Excipientes: Butilhidroxitolueno, macrogol.

#### **Indicaciones:**

Tiene aplicación en el tratamiento tópico de diversas micosis como pie de atleta, tiña crural, tiña corporal y de las manos provocadas por *T. rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. tonsurans*, *M. Canis*, *M. andouinii* o *E. floccosum*.

También es efectiva en el tratamiento de la tiña versicolor (pitiriasis versicolor) causada por *pityrosporum furfur*.

Tolnaftato solución debe asociarse a agentes keratolíticos cuando se trata de lesiones producidas en la planta de los pies o manos.

#### **Clasificación:**

Antimicótico de acción tópica.

#### **Contraindicaciones:**

No aplicar cerca de los ojos. Pueden ocurrir reacciones de sensibilización o de irritación durante el curso del tratamiento; en este caso debe suspenderse la aplicación.

#### **Interacciones:**

No descritas en bibliografía revisada.

#### **Efectos indeseables:**

Generalmente la solución de Tolnaftato no produce sensibilización ni irritación de la piel, aún cuando se aplica sobre áreas lesionadas. Sin embargo, algunos casos de irritación o sensibilización se han relacionado con esta droga.

#### **Precauciones:**

Si el paciente no muestra mejoría después de 4 semanas de tratamiento debe revisarse el diagnóstico.

En infecciones mixtas con presencia de microorganismos no susceptibles se debe aplicar una terapia complementaria, en forma tópica o sistémica.

#### **Dosis y modo de empleo:**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular.

Lo recomendado es aplicación en forma tópica: de una a tres gotas de la solución se frota 2 veces al día sobre el área afectada hasta cubrir completamente la parte lesionada.

El tratamiento dura generalmente 2 o 3 semanas, pero hay casos en que es necesario 4 o 5 semanas para obtener mejoría.

#### **Sobredosis:**

No se han descrito casos de sobredosis por vía tópica.

En caso de aparecer síntomas de sobredosis, trasladar al paciente, junto con este folleto, a un establecimiento asistencial para observación o para el tratamiento de los síntomas y control de los signos vitales.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor; la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener el producto a temperatura ambiente.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.

D-ME-120-30-10413-03