

**Tonaril®**  
**Comprimidos 2 mg**  
**Trihexifenidilo clorhidrato**

**Composición y presentación:**

Cada comprimido contiene:

Trihexifenidilo clorhidrato 2 mg

Excipientes: Celulosa microcristalina, almidón glicolato de sodio, calcio fosfato, magnesio estearato.

**Clasificación:**

Antiparkinsoniano.

**Indicaciones:**

Tratamiento sintomático del parkinsonismo. Control de síntomas extrapiramidales inducidos por fármacos.

**Advertencias:**

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

**Contraindicaciones:**

No usar en personas con glaucoma o que presenten hipersensibilidad a la droga.

**Interacciones:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Alcohol, Depresores del SNC, Anticolinérgicos, Inhibidores de la MAO (Furazolidona, Procarbazina y Seligenina), Antidiarreicos adsorbentes, Clorpromazina.

**Efectos indeseables:**

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: sequedad de la boca, visión borrosa, estreñimiento; náuseas, vómitos; dificultad o dolor durante la micción (especialmente en hombres).

**Reacciones adversas:**

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto y/o si presenta algún otro efecto o síntoma no descrito en este folleto consulte a su médico: rash cutáneo, aumento de la presión ocular (dolor ocular), perturbaciones psíquicas, confusión, excitación, reacciones paranoicas especialmente en ancianos.

**Precauciones:**

Administrar con precaución en enfermos con glaucoma, enfermedad obstructiva del aparato digestivo o génito-urinario y en pacientes de edad avanzada, los que son más sensibles que los adultos a las dosis habituales de este medicamento. Consultar al médico antes de suspender el tratamiento, puede ser necesario reducir gradualmente la dosificación. Evitar la ingesta de alcohol o de otros depresores del sistema nervioso central. Evitar el empleo de antidiarreicos 1 o 2 horas antes o después de la administración de este medicamento. Puede producir somnolencia o mareos, precaución en personas que realizan actividades que requieran atención.

**Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento apropiado a su caso en particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Parkinsonismo:** 1 a 2 mg el primer día, aumentando la dosificación con otros 2 mg más, a intervalos de 3 a 5 días hasta obtener la respuesta deseada o hasta 6 a 10 mg, usualmente dividido en tres dosis, con las comidas.

- **Reacciones extrapiramidales inducidas por fármacos:** Inicialmente 1 mg al día, aumentando la dosis según necesidad y tolerancia o hasta que la dosis diaria total sea de 5 a 15 mg.

**Modo de empleo:**

Administrar por vía oral. Ingerir este medicamento con alimentos para disminuir la irritación gástrica.

**Sobredosis:**

Síntomas de sobredosis: inestabilidad, somnolencia; sequedad de boca, nariz o garganta; latidos cardíacos rápidos; sensación de falta de aire o problemas para respirar, sequedad y rubor en la piel.

Alucinaciones, crisis convulsivas, problemas para dormir, cambios en el estado de ánimo.

En caso de sobredosis accidental, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial de urgencia, para un tratamiento sintomático y de mantención que puede incluir: inducción del vómito o lavado gástrico y administración de medicamentos intravenosos. Llevar este folleto informativo.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños; protegido del calor y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.