

Trittico® AC
Trazodona clorhidrato
Comprimidos de liberación prolongada 150 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido de liberación prolongada contiene:

Trazodona clorhidrato 150 mg

Excipientes: Estearato de magnesio, polividona, cera carnaúba, sacarosa.

Clasificación:

Antidepresivo.

Indicaciones:

Este medicamento se usa para tratar la depresión con o sin ansiedad asociada.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Pueden requerirse hasta 4 semanas para que los resultados terapéuticos sean significativos, aunque la gran mayoría de los pacientes notan la mejoría en 2 semanas. El tratamiento no debe interrumpirse bruscamente.

Advertencia especial:

Este medicamento no debe administrarse a menores de 18 años de edad. Se ha visto que el uso de antidepresivos en niños y adolescentes aumenta el riesgo de pensamientos y conductas suicidas.

Contraindicaciones:

No usar en personas con hipersensibilidad a la droga.

No usar en el infarto del miocardio o durante el período de recuperación.

No usar en embarazo ni durante la lactancia.

Evaluar cuidadosamente su uso en alcoholismo activo, enfermedad cardíaca, falla hepática o renal.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Depresores del sistema nervioso central, Antidepresivos tricíclicos, Haloperidol, Alcohol, Antihipertensivos, Anticolinérgicos, Antihistamínicos, Digoxina.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: sabor desagradable, mareos, somnolencia, sequedad de boca, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, si se acentúan o no desaparecen consulte a su médico.

Reacciones adversas:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto consulte a su médico: Sobre el sistema nervioso central: confusión y temblores musculares. Reacción alérgica, latidos cardíacos rápidos o lentos, hipotensión, desmayos, priapismo (erección prolongada, dolorosa e inapropiada del pene), excitación no habitual. Pérdida de la coordinación muscular.

Precauciones:

Consultar al médico antes de suspender el tratamiento, puede ser necesario reducir gradualmente la dosis. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas y de otros depresores del SNC durante el

tratamiento. Puede producir mareos, tener precaución al levantarse bruscamente desde una posición en reposo, puede producir sequedad en la boca, para aliviarla usar caramelos o chicles sin azúcar. En los pacientes geriátricos es más probable que se produzca sedación.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento más apropiado para su caso particular; no obstante, las dosis usuales recomendadas son:

- **Como ansiolítico o antidepresivo:** 50 a 150 mg al día.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral. Los comprimidos de Trittico AC, liberan el principio activo en forma prolongada lo que permite dosificarlo una vez al día. En lo posible tomar este medicamento con alimentos o poco después de las comidas o de un refrigerio para reducir al mínimo las molestias gástricas y el riesgo de mareos o adormecimiento. Cumplir estrictamente el tratamiento. Si por olvido omite una dosis, tomarla lo antes posible. No duplicar dosis.

Sobredosis:

No existe antídoto específico. En caso de sobredosis accidental, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial de urgencia, para un tratamiento sintomático y de mantención. Monitorear las funciones cardiorrespiratorias. Llevar este folleto informativo.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, protegido del calor, la humedad y fuera del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.