

Vick Freshmel propóleo Comprimidos 5 mg

Indicaciones:

Este producto está recomendado junto al medicamento indicado por su médico, en el alivio de las molestias de la garganta producidas por infecciones bucofaríngeas (Faringitis, amigdalitis).

Clasificación:

Antiséptico Bucofaríngeo.

Vía de administración:

Oral.

Dosis:

Disolver en la boca un comprimido cada 3 o 4 horas, con un máximo de 8 comprimidos por día.

Composición y presentación:

Vick Freshmel comprimidos 5 mg.

Fórmula:

Cada comprimido contiene:

Clorhexidina diclorhidrato 5 mg.

Excipientes: aspartamo, colorante FD&C amarillo N°5 lacado, colorante FD&C amarillo N°6 lacado, esencia de miel, esencia de propóleo estearato de magnesio, sorbitol.

Advertencias y precauciones:

Las amigdalitis y otras infecciones pueden causar graves problemas a largo y mediano plazo si no son tratadas con los medicamentos adecuados y a través de un diagnóstico médico. Este medicamento puede aliviar el dolor de garganta y otros problemas asociados a este tipo de enfermedades, pero no cura ni, previene las complicaciones mencionadas. Si el dolor de garganta o las molestias bucofaríngeas persisten por más de 5 días, suspenda el medicamento y consulte al médico.

- No usar si usted ha experimentado alergias a desinfectantes cutáneos, enjuagatorios bucales u otros antisépticos bucofaríngeos de otra marca.
- **Embarazo:** No usar salvo indicación médica.
- **Lactancia:** No usar salvo indicación médica.
- **Niños:** No usar en menores de 12 años sin indicación médica.
- **Ancianos:** Usted debe informar a su médico o químico farmacéutico respecto de las enfermedades que tiene o los medicamentos que usa antes de hacer uso de este medicamento en personas de tercera edad.
- No usar en cuadros de Fenilcetonuria.
- **Otras:** Acuda a su médico o químico farmacéutico ante cualquier duda respecto a la administración, efectos, riesgos o cualquier otro aspecto que usted considere importante aclarar o mencionar antes del uso del medicamento.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede ser modificado por su administración junto con otros (interacción).

Es muy importante que consulte con el médico o químico farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento si está tomando otros.

Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede ser modificado por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe hacer mención de ella al médico o químico farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: Problemas respiratorios, cardíacos o digestivos.

Efectos adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados especialmente si se toman por un período prolongado de tiempo y/o en grandes dosis. Si aparece cualquiera de los síntomas siguientes deje de tomar el medicamento y consulte al médico: Mareos, náuseas o vómitos / Problemas respiratorios.

Otros efectos indeseables sólo son pasajeros y normalmente no requieren atención médica: Manchas en los dientes / Molestias gástricas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original protegido del calor y fuera del alcance de los niños.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en e envase.