

Vick TrataTos

Jarabe 70 mg/5 ml

Composición y presentación:

Cada 5 mL de jarabe contiene:

Extracto seco de hojas de Hedera Helix L. (5-7, 5:1) 70 mg (Equivalente a 7 mg de Hederacósido C)

Excipientes: Sorbitol, sorbato de potasio, goma xantano, ácido cítrico, esencia de Hiel y menta, agua purificada.

Sin alcohol, azúcar ni colorantes.

Clasificación:

Expectorante-Bronco Espasmolítico.

Indicación:

Tratamiento de los síntomas de enfermedades bronquiales inflamatorias, acompañadas de tos.

Administración:

Vía oral.

Agítese bien el jarabe antes de usar.

Dosis:

- **La dosis usual en adultos recomendada es:** 2,5 mL a 3,5 mL de jarabe 3 a 5 veces a día.

- **Niños de 4 y más años:** 2,5 mL de jarabe 3 veces al día.

Duración tratamiento:

La duración del tratamiento depende del tipo y la severidad del cuadro clínico; de todos modos, el tratamiento debe durar como mínimo una semana aún en el caso de inflamaciones menores del tracto respiratorio. El tratamiento con Vick TrataTos jarabe debe mantenerse durante 2 - 3 días después que los síntomas han cesado, con el fin de asegurar el éxito duradero del tratamiento. No debe administrarse por, más de 15 días consecutivos, a menos que el médico lo indique.

En caso de malestares persistentes o de aparición de insuficiencia respiratoria (dificultad para respirar) fiebre o también expectoración purulenta o con sangre, se debe consultar con el médico de inmediato.

Advertencias:

Este medicamento no debe ser usado más de 15 días. Si no ceden los síntomas, consulte al médico.

Este medicamento es sólo para uso en niños mayores de 4 años.

Si tiene alguna duda en el uso de este producto, consulte al químico farmacéutico o al profesional de salud más cercano.

En caso de reacción alérgica, se debe suspender el medicamento y comunicarlo a su médico; especialmente las personas que alguna vez han presentado reacciones alérgicas a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes,

saborizantes y otros medicamentos. Si el consumo de este medicamento le produce efectos adversos severos o incontrolables, suspenda el tratamiento y consulte al médico. La administración del medicamento a los niños debe ser efectuada por un adulto responsable.

Contraindicaciones:

No administrar a niños menores de 4 años, ni a mujeres embarazadas o en período de lactancia.

No administrar en casos de antecedentes de alergia o hipersensibilidad a alguno de los componentes de esta formulación.

Efectos adversos:

Aunque los efectos secundarios de este medicamento no son comunes, en individuos sensibles a alguno de sus componentes, podrían llegar a presentarse malestares gastrointestinales (como náuseas, vómitos o diarrea ligera) o reacciones alérgicas. En casos raros puede tener un efecto laxante, debido al contenido de sorbitol presente en este producto.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros, Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta antes de usar este fármaco.

Hasta la fecha no se han descrito interacciones en el caso de ingestión simultánea de este producto con otros medicamentos.

Sobredosis:

- **Síntomas:** En general es bien tolerado y prácticamente no presenta reacciones adversas. En ciertas condiciones, podría manifestarse un leve efecto laxante.

- **Tratamiento:** Si aparecieran síntomas molestos, el paciente debe suspender la administración y consultar al médico o acudir a un centro asistencial.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor a no más de 30°C; la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.