

Cefazolina

Polvo para solución inyectable 1 g

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Composición y presentación:

Cefazolina Polvo para solución inyectable 1 g
Cada frasco - ampolla contiene: Cefazolina 1 g
(como sal sódica)

Clasificación:

Antibiótico (Cefalosporina)

Indicaciones:

La cefazolina se usa para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por agentes sensibles al antibiótico.

- Focos infecciosos provocados por bacterias resistentes a otros antibióticos.
- Infecciones respiratorias: bronquitis crónica, neumonía.
- Infecciones urinarias: pielonefritis aguda.
- Infecciones cutáneas: furunculosis, abscesos.
- Infecciones graves como septicemia, endocarditis infecciosa, infección vesicular.
- En cirugía, para prevenir infecciones postoperatorias.

Precauciones y advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Administrar con cuidado en enfermos renales; puede ser necesario reducir las dosis en enfermos renales. Si se produce algún tipo de reacción alérgica, su uso debe ser discontinuado de inmediato y consultar al médico.

Embarazo y Lactancia: No se ha informado de efectos perjudiciales, pero se supone que puede llegar a la placenta y que se elimina en pequeña proporción por la leche, lo que puede provocar reacciones alérgicas en el lactante. Usar con precaución y si es absolutamente necesario.

Tratamientos largos pueden favorecer el desarrollo de infecciones por hongos (candidiasis). Evitar ingerir bebidas alcohólicas. Controlar el tratamiento en pacientes con alteraciones renales o hepáticas.

Antes de iniciar el tratamiento, si es posible, se debe identificar el germen causante y efectuar test de sensibilidad al antibiótico. Cumplir con el tratamiento completo. Las personas sensibles a las penicilinas, también pueden serlo a las cefalosporinas.

Contraindicaciones:

No usar en caso de presentar reacción alérgica (hipersensibilidad) o de tener antecedentes de hipersensibilidad a derivados de la penicilina. Insuficiencia renal severa.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con: alcohol, anticoagulantes, diuréticos, antibióticos aminoglicósidos. No se aconseja la asociación con estos productos sin supervisión directa del médico.

Reacciones adversas o efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir algunos efectos indeseables que generalmente no requieren atención médica, a menos que permanezcan o causen molestias como dolor en el sitio de la inyección; desarrollo de hongos (Candidiasis).

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto y/o si presenta algún otro efecto o sintoma no descrito en este folleto consulte a su médico. Diarrea violenta, alteraciones renales o hepáticas (dolores abdominales, ictericia) Reacciones graves de hipersensibilidad que requieren atención médica inmediata: urticaria, rubor, prurito, hinchazón, hipotensión arterial (desmayo), crisis asmática, inflamación y obstrucción de la garganta.

Hay también otro tipo de reacciones adversas que deben ser consultadas con el médico: diarrea violenta, alteraciones renales o hepáticas y de la composición sanguínea (fiebre, dolor de garganta, ronquera, hemorragias, moretones).

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es: 0,5 a 1 gramo cada 12 horas, por vía intramuscular o endovenoso, según el tipo de infección.

Modo de empleo:

Administrar por vía intramuscular profunda o por vía endovenosa directa en forma lenta (durante 3 a 5 minutos); o como infusión, diluida en una solución compatible.

Vía intramuscular: Diluir con 4,0 mL de agua para inyectables (se obtiene un volumen final de 5,0 mL). No aplicar más de 1 g en un mismo punto, cuando se usa vía IM.

Inyección intravenosa directa: Diluir en 10 mL de agua para inyectables. Inyectar lentamente en 3 a 5 minutos.

Infusión intravenosa: Puede diluirse con 50 a 100 mL de las siguientes soluciones, previa dilución con 4,0 mL de agua para inyectables:

Suero fisiológico
Suero glucosado 5%

Sobredosis:

Síntomas: Las Cefalosporinas son de baja toxicidad para el hombre; sin embargo, puede producir reacciones alérgicas graves. No existe antídoto específico, por lo que el tratamiento de la sobredosis y de las reacciones alérgicas es sintomático y de mantenimiento, y debe ser realizado en un establecimiento asistencial de urgencia.

Diarrea o colitis intensa, crisis convulsivas se han mencionado entre otros síntomas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños, protegido del calor, la luz y la humedad. Una vez reconstituida la solución en agua para inyectables, es estable por 24 horas a temperatura ambiente (menor a 25°C) y por 48 horas bajo refrigeración (2-8°C).

Durante el almacenamiento en refrigeración y/o a bajas temperaturas ambientales, la solución puede formar un precipitado blanco, el cual desaparece por calentamiento leve en agua tibia o al calor de las manos.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.