

## **Daclin Clindamicina 600 mg / 4 mL**

### **Solución inyectable**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Fórmula: Cada ampolla contiene: Clindamicina (como fosfato) 600 mg  
Alcohol bencílico, edetato disódico, hidróxido de sodio, agua para inyectables c.s.

### **Indicaciones:**

Tratamiento de infecciones provocadas por gérmenes sensibles a clindamicina demostrado por antibiograma, como infecciones crónicas de huesos, articulares, septicemia, infecciones graves intraabdominales, infecciones de la pelvis y tracto genital femenino, infecciones de tracto respiratorio inferior, infecciones de la piel y sus estructuras.

### **Advertencias:**

Este medicamento contiene Alcohol Bencílico, no usar en neonatos.

Diarrea persistente puede ocurrir durante la terapia con Clindamicina, la droga debe ser rdiscontinuada o si es necesario continuar el tratamiento sólo bajo observación médica.

Casos moderados a severos, incluirlo aquellos con ulceración o formación pseudomembranosa, deben ser controlados con líquidos, electrolitos y suplementos protéicos.

Estudios recientes indicaron que una toxina (o toxinas) producida por bacterias del género Clostridium es la principal causa directa de colitis asociada a antibióticos. Cuando se administra oralmente 125 mg a 500 mg de Vancomicina, 4 veces al día, se observa un rápido desaparecimiento de la toxina y una mejora clínica de la diarrea.

### **Contraindicaciones:**

Esta droga está contraindicada en individuos con historial de hipersensibilidad a preparaciones que contienen Clindamicina o Lincomicina, o cualquiera de los excipientes que compongan este medicamento.

### **Interacciones:**

- Clindamicina es incompatible con ampicilina, difenildantoina, barbitúricos, aminofilina, gluconato de calcio y sulfato de magnesio.
- Con agentes bloqueadores neuromusculares, como tubocurarina, pancuronio.
- Antagonismo con aminoglucósidos y con eritromicina.

### **Reacciones Adversas:**

Gastrointestinal: Sabor desagradable o metálico después de una administración intravenosa.

Reacciones de hipersensibilidad: Rash macopapular y urticaria. Rash morbiliforme de generalizado suave a moderado es más frecuente.

Hepáticas: Ictericia y anormalidades de la función hepática han sido observadas.

Hematopoyéticos: Neutropenia (leucopenia) y eosinofilia pasajeras han sido relatadas.  
Reacción local: Dolor, induración y abscesos estériles se han reportado después de una inyección intramuscular y tromboflebitis después de una infusión intravenosa.

**Precauciones:**

- Pacientes con historia de enfermedades gastrointestinales, colitis particularmente.
- Clindamicina fosfato no debe ser inyectada por vía endovenosa sin ser diluida y la infusión debe ser administrada a lo menos sobre los 20 - 60 minutos, conforme a las indicaciones de posología.

**Posología:**

Adultos:

Vía parenteral (administración I.M. ó E.V.).

- Infecciones moderadas o causadas por microorganismos patógenos altamente sensibles: 600 mg/día en dos dosis iguales.

- Infecciones moderadamente graves: 600 1200 mg/día dividida en 2, 3 ó 4 dosis iguales.

En caso de infecciones aún más graves, la dosis puede ser aumentada, en circunstancias que coloquen en riesgo la vida del paciente, las dosis pueden ser elevadas a 4800 mg diarios por vía indovenosa, en adultos.

Alternativamente, la droga puede ser administrada en forma de infusión rápida y única para la primera dosis, seguida por una infusión endovenosa continúa, como lo indica la siguiente tabla.

Para mantener niveles séricos de Clindamicina	Infusión rápida	Infusión de mantención
Sobre 4 mcg/ ml	10 mg/min por 30 minutos.	0,75 mg/min.
Sobre 5 mcg/ ml	15 mg/min por 30 minutos.	1,00 mg/min.
Sobre 6 mcg/ ml	20 mg/min por 30 minutos.	1,25 mg/min.

Niños: Mayores de 1 mes de vida:

Vía parenteral (administración I.M o E.V).

- Infecciones moderadas o infecciones debida a microorganismos patógenos altamente sensibles: 10 - 15 mg/Kg/día en 3 a 4 dosis iguales.

- En infecciones moderadamente graves: 15 - 25 mg/Kg/ día en 3 a 4 dosis iguales.

- Infecciones graves: 25 - 40 mg/Kg/día en 3 a 4 dosis iguales.

Como una alternativa para la dosificación con base en el peso corporal, la dosis para niños puede ser determinada en m<sup>2</sup> de superficie corporal

Indice de Dilución e Infusión:

Debe ser diluido antes de administrarlo vía endovenosa, la concentración de Clindamicina diluida para infusión no debe exceder 18 mg/ml y la velocidad de infusión no debe exceder los 30 mg/min.

Dosis	Diluyente	Tiempo
300 mg	50 ml	10 min.
600 mg	50 ml	20 min.
900 mg	50 - 100 ml	30 min.
1200 mg	100 ml	40 min.

**Modo de empleo:**

Después de diluido, usar dentro de 24 horas.

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.

**Condiciones de Almacenamiento:**

Mantener a temperatura ambiente entre 10 a 25° C, protegido de la luz.