

Atorvastattina 40mg Comprimidos recubiertos

Contienen información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Orientación al paciente:

Estimado (a) Usuario (a):

Su médico le ha prescrito Atorvastatina, el tratamiento Hipocolestiromiante más adecuado para usted. Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de comenzar el tratamiento. Guarde este folleto y compruebe que el medicamento corresponda al que su médico le indicó. Si tiene cualquier duda consulte a su médico.

¿Qué es Atorvastatina?

Atorvastatina es un tratamiento hipocolesteremiante que ayuda a prevenir trastornos de salud causados por el aumento de colesterol en la sangre. Cada comprimido contiene Atrvastatina (como Atorvastatina Cálcica forma Trihidrato) 40 mg, en envases de 30 comprimidos recubiertos.

Indicaciones:

Atorvastatina está indicado para la reducción de los niveles sanguíneos de colesterol total. Colesterol-LDL. Apolipoproteínas B y triglicéridos en pacientes con hipercolesterolemia primaria (heterocigota familiar) y dislipidemia mixta, en quienes las medidas dietéticas no han surtido efecto. Tratamiento a pacientes hipertensos con colesterol total total normal o moderadamente elevado (menor a 250mg/dL) y que tienen asociados al menos otros tres factores de riesgo cardiovascular clásico para :

- _ Reducir el riesgo de enfermedad coronaria cardíaca fatal e infarto al miocardio no fatal.
- _ Reducir el riesgo de procedimientos de revascularización y angina pectoris.

Atorvastatina está indicada en pacientes con diabetes tipo II sin evidencia de enfermedad coronaria cardíaca pero con múltiples factores de riesgo para enfermedad coronaria cardíaca, tales como retinopatía, albuminuria, fumador o hipertensión para:

- _ Reducir el riesgo de infarto al miocardio.
- _ Reducir el riesgo de apoplejía o accidente vascular encéfalico.

En pacientes con evidencia de enfermedad coronaria cardíaca, atorvastatina está indicada para:

- _ Reducir el riesgo de infarto al miocardio no fatal.
- _ Reducir el riesgo de accidentes vascular encéfalico fatal y no fatal.
- _ Reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca.
- _ Reducir el riesgo de angina.

¿Cómo se debe tomar atorvastatina?

Es importante que el comprimido sea ingerido con agua, tómelo siempre a la hora y en la cantidad exacta que le recetó su médico, puede tomárselo con o sin alimentos.

Recuerde pedir a su médico una dieta y ejercicio físico apropiado a su caso.

No suspenda por su cuenta el uso del medicamento ya que puede aumentar sus niveles de colesterol nuevamente.

¿Qué debo hacer si me ocurre alguna molestia mientras tomo Atorvastatina?

Ante cualquier duda sobre alguna molestia no habitual mientras esté en tratamiento, siempre consulte a su médico.

Recomendaciones generales:

Evite su consumo durante el embarazo y lactancia. Informe a su médico de todos los medicamentos que esté usando. Informe a su médico de alergias a medicamentos, alimentos u otros. Mantenga el producto en su envase original, protegido de la luz, calor, humedad y alejado de los niños.

Composición y Presentación:

Cada comprimido recubierto contiene:

Atorvastatina (como Atorvastatina Cálcica forma I Trihidrato) 40mg

Excipientes: Celusa microcristalina, croscarmelosa, magnesio estearato, sodio carbonato, maltosa, hipromelosa, titanio dióxido, polisorbato, hiprolosa, trietilcitrato.

Vía de Administración: Oral.

Clasificación: Hipocolesteremiante.

Indicaciones: Este medicamento ayuda a prevenir trastornos de salud causados por aumento de colesterol en la sangre.

Este medicamento debe ser usado sólo por indicación de su médico.

Advertencias y Precauciones:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre usted y su médico.

Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

A) Alergias: Usted debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimento, preservantes, colorantes, saborizantes, u otros medicamentos.

b) Embarazo: No debe tomar este medicamento sin antes comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo. Este medicamento no se debe usar durante el embarazo o por mujeres que estén en condiciones de embarazarse. En el último caso debe usarse un método de control de la natalidad adecuado, durante el tratamiento con este medicamento. Si usted cree estar embarazada, consulte inmediatamente con su médico. Este medicamento puede causar defectos en el feto u otros problemas si se toma durante el embarazo.

c) Lactancia: Uste debe conversar con el médico acerca de la conveniencia del uso de este producto mientras esté amamantando.

d) Niños: Este medicamento está indicado para su uso en niños sólo bajo estricta prescripción y en las condiciones indicadas por el médico especialista (en esta población de pacientes no se ha estudiado dosis superiores a 20mg).

e) Antes de preescribir este medicamento, su médico a usted una dieta apropiada su casa específico. Muchas personas pueden controlar adecuadamente su colesterol sanguíneo con sólo seguir la dieta adecuada y ejercicio físico indicado por el médico. El medicamento se prescribe sólo si se necesita una medida adicional y si es efectiva sólo si se sigue adecuadamente un régimen dietético y de ejercicios físicos apropiados.

f) Este medicamento puede ser menos eficaz si usted presenta un sobrepeso exagerado, por lo que puede ser importante el previo seguimiento de una dieta, debidamente supervisada por su médico.

g) Es importante que el médico evalúe el progreso de su tratamiento a intervalos regulares para comprobar si el medicamento disminuye sus niveles de colesterol y que no causen efectos indeseables.

h) No suspensa por su cuenta la administración de este medicamento sin consultarlo previamente con su médico. Al dejar de tomar este medicamento sus niveles de colesterol pueden aumentar nuevamente. Su médico puede considerar conveniente indicar a usted una dieta apropiada para prevenir que este ocurra.

l) Antes de ser sometido a cualquier clase de cirugía (incluyendo cirugía dental) o algún tratamiento de emergencia, comunique al médico o dentista correspondiente, que usted está tomando este medicamento.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto a otros (interacciones). Usted debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco.

Es particularmente importante que su médico sepa si usted está tomando ciclosporina, anticoagulantes (medicamentos que previenen los coágulos sanguíneos, tales como warfina o acenocumarol), medicamentos antimicóticos (que sirven para combatir hongos tales como ketoconazol, itraconazol, etc) otros medicamentos para reducir el colesterol tales como bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozilo, los antibióticos eritromicina y claritromicina, inhibidores de la proteasa del VIH (un tipo de medicamentos empleados para combatir el SIDA, tales como indinavir, nelfinavir, zidovudina, y saquinavir), el antidepresivo nefazodona o dosis altas (más 1 gramo diario) de nicotinamida o ácido nicotínico (niacina).

Presencia de otras enfermedades

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. Usted debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en las cosas siguientes:

Alcoholismo o antecedentes de abuso de bebidas alcohólicas .
Enfermedades del hígado (el uso de este medicamento podría agravarlos).
Niveles de enzimas hepáticas permanentemente elevadas.
Infecciones severas.
Presión arterial baja.
Convulsiones.
Transplante de órganos con terapia para prevenir rechazo.
Cirugía mayor reciente (estos pacientes pueden tener riesgos de desarrollar alteraciones que lleven a insuficiencia renal).

Efectos Adversos: (no deseados)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretenden obtener. Alguno de estos efectos pueden requerir atención médica. Consulte inmediatamente al médico si presenta algunos de los síntomas siguientes:

Raramente, puede presentarse fiebre, dolor o calambres musculares, dolor estomacal severo, cansancio o debilidad inusual. Pueden ocurrir otros efectos no deseados usualmente no requieren atención médica y desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico. Con mayor frecuencia puede presentarse trastornos digestivos tales como constipación o diarrea, flatulencia, náuseas, dolor estomacal y ardor en la boca del estómago. También puede presentarse mareos, erupciones de la piel, y dolor de cabeza. Si usted nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte a su médico.

Forma de Administración:

Tómese este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia que la que su médico indique. Asegúrese que el producto que va a tomar corresponda a la dosis recetada por el médico.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo apropiados a su caso particular. No obstante la dosis usual recomendada en adultos es: Un comprimido de 10 mg al día inicialmente, esta dosis se puede aumentar hasta un comprimido de 80mg al día, según el diagnóstico y criterio del médico tratante. En caso de pacientes pediátricos, la dosis inicial recomendada de Atorvastatina Cálctica es de 10mg / al día. La dosis máxima recomendada es de 20 mg/día (en esta población de pacienets no se han estudiado dosis superiores a 20 mg).

Condiciones de almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños, en su envase original, a menos de 30°C.
protegido del calor y la humedad.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica

No recomiende este medicamento a otra persona.