

Amobiotic Comprimidos dispersables 1 g

Composición y presentación:

Cada comprimido dispersable contiene:

Amoxicilina (como trihidrato) 1 g

Excipientes: Crospovidona, aroma frambuesa, sacarina sódica dihidrato, magnesio estearato, sodio lauril sulfato, celulosa microcristalina.

Indicaciones:

Tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio superior e inferior, tracto urinario, piel y tejidos blandos, sepsis intra-abdominal y osteomielitis producidas por microorganismos sensibles demostrado por antibiograma.

Usos:

Amobiotic se usa para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por agentes sensibles al antibiótico. Infecciones del tracto génito-urinario. Gonorrea. Infecciones de las vías respiratorias, como sinusitis, otitis media, bronquitis crónica, neumonía. Infecciones del tracto digestivo como salmonelosis y erradicación del *Helicobacter pylori*. Infección de la piel y sus anexos.

Clasificación:

Antibiótico.

Advertencias y precauciones:

- Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.
- Cuando sea posible, se debe identificar el germen causante y efectuar test de sensibilidad al antibiótico.
- El tratamiento con antibióticos, puede inducir el desarrollo de otros gérmenes infecciosos no sensibles, especialmente hongos.
- Administrar con cuidado en enfermos renales o con problemas hepáticos.
- Si se produce algún tipo de reacción alérgica, su uso debe ser discontinuado.
- **Embarazo y lactancia:** No se ha informado de problemas en la madre o el recién nacido, pero se sabe que puede llegar a la placenta y que se elimina en pequeña proporción por la leche, lo que puede provocar reacciones alérgicas, candidiasis, diarrea y rash cutáneo en el lactante. La administración de amoxicilina durante estos períodos debe ser evaluada por el médico tratante.
- Evite el consumo de alcohol mientras esté tomando amoxicilina ya que aumenta el riesgo de sufrir efectos adversos.

Contraindicaciones:

- Las penicilinas pueden provocar reacciones alérgicas graves. No usar en caso de haber sufrido anteriormente reacciones de hipersensibilidad con las penicilinas o sus derivados (como cefalosporinas).
- No usar si ha presentado reacciones alérgicas a endulzantes sintéticos como sacarina.

Interacciones:

Informe al médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta.

Se han descrito interacciones con: Cloranfenicol, Tetraciclinas, Eritromicina, Lincomicina, metotrexato y probenecid.

- **Alopurinol:** Aumenta el riesgo de erupción cutánea.
- **Anticonceptivos orales:** Pueden perder su eficacia anticonceptiva.
- No es recomendable la asociación de amoxicilina con estos productos salvo indicación médica.

Efectos adversos:

Si se presentan reacciones adversas de tipo alérgico o de hipersensibilidad, suspenda el medicamento y acuda a su médico. Las reacciones de hipersensibilidad pueden ser:

- **Inmediatas (entre 2 a 30 minutos):** Urticaria, rubor, prurito difuso, hipotensión arterial e inflamación repentina de la boca y garganta que dificulta la respiración (edema laríngeo).
- **Reacciones tardías, (después de unas horas o días):** Picazón, reacción de inflamación local reacciones cutáneas graves, urticaria, dolor de articulaciones, y menos frecuente fiebre.
- **Otras reacciones:** Hepatitis, ictericia (color amarillo de ojos y piel, orina color café, dolor de la zona abdominal). El uso de este medicamento puede producir también, algunos efectos indeseables que usualmente no requieren atención médica, a menos que persistan o se agraven: prurito, náuseas, vómitos, diarrea pasajera, dolor de cabeza, mareos, modificación de la flora intestinal.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y la duración del tratamiento apropiados a su caso particular; no obstante, la dosis usual recomendada es:

- **Adultos:** 1000 mg (1 gramo) cada 12 horas.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral con un vaso de agua; se puede tomar con el estómago lleno en caso de provocar molestias. Los comprimidos dispersables, de 1 gramo se deben tomar después de suspendidos en un poco de agua o de jugo, una vez que se hayan desintegrados completamente. Es importante no omitir ninguna dosis y tomarla a intervalos regulares. Dosis olvidada: tomarla lo antes posible pero es preferible no tomarla si faltara poco tiempo para la dosis siguiente. No duplicar la dosis.

Sobredosis:

La Amoxicilina es de baja toxicidad para el hombre; sin embargo, puede producir reacciones alérgicas graves que pueden requerir el uso de corticoides, soluciones hidratantes y vasopresores inyectables, además de apoyo respiratorio. No existe antídoto específico, por lo que el tratamiento de sobredosis y de las reacciones alérgicas es sintomático y con medidas de mantenimiento. Debe ser realizado en un establecimiento asistencial de urgencia.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, de la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.