

Autdol
Diclofenaco sódico
Suspensión para gotas 1,5%

Composición y presentación:

Cada mL de suspensión contiene:

Diclofenaco sódico 15 mg

Excipientes: glicerol, metilparabeno, sorbitol, sacarina sódica, esencia, goma xantano, glicirricinato de amonio, celulosa microcristalina-sodio carboximetilcelulosa, ácido cítrico, agua purificada.

Clasificación:

Analgésico antiinflamatorio no esterooidal.

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento sintomático de procesos inflamatorios, dolorosos y en síndrome febril.

Advertencias:

Debe consultar al médico antes de usar Diclofenaco, si el paciente tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca). Asimismo debe comunicar al médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Además se recomienda efectuar controles periódicos con su médico, para evaluar la evolución del dolor o inflamación. La administración por más de una semana debe ser con control médico.

Contraindicaciones:

- No se debe administrar a personas con antecedentes de hipersensibilidad al diclofenaco o en personas que hayan desarrollado asma, urticaria, angiodema, broncoespasmo, rinitis severa.
- No se debe usar Diclofenaco en el período inmediato a una cirugía de by-pass coronario.
- Con la administración de Ácido Acetilsalicílico u otros analgésicos no esteroideos.
- Pacientes con úlcera gastroduodenal activa.
- **Embarazo:** Primer trimestre de embarazo y en segundo trimestre sólo bajo supervisión médica.
- No administrar a niños menores de un año.

Interacciones:

Antes de consumir éste y cualquier medicamento, informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta.

Autdol presenta interacciones con: Ácido acetilsalicílico, anticoagulantes orales, corticoides, sales de litio, diuréticos que eliminan potasio (furosemida, tiazidas) y diuréticos ahorradores de potasio (espironolactona, triamterena, amilorida), antihipertensivos, antidiabéticos como clorpropamida, metmorfina, glibenclamida o insulina, digoxina, fenitoína.

Efectos indeseables (reacciones adversas):

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: Náuseas, constipación, diarrea, sequedad de la boca, sed, malestar estomacal, alteraciones digestivas. En raras ocasiones han aparecido alteraciones de la sensibilidad, trastornos oculares, alteración auditiva pasajera (tinnitus). Los medicamentos pueden producir efectos no deseados, además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos, si persisten o son muy molestos, se deben comunicar al médico.

El paciente puede presentar alguna de las siguientes reacciones adversas:

- **A nivel gastrointestinal:** Vómitos, colitis, ulceraciones del colon, úlcera péptica, sangramiento gastrointestinal.
- **Efectos sobre el sistema nervioso central:** Dolor de cabeza, desvanecimiento, somnolencia, depresión, insomnio y ansiedad.
- **Efectos renales:** Daño en la función renal, insuficiencia renal aguda.
- **Efectos hepáticos:** Ictericia, hepatitis asintomática, hepatitis aguda, hepatitis crónica aguda.
- **Efectos respiratorios:** Asma, infecciones del tracto respiratorio (neumonía, faringitis, bronquitis).
- **Efectos cardiovasculares:** Retención de líquidos, la cual se manifiesta principalmente como edema (inflamación de piernas y tobillos).
- **Efectos sobre la piel:** Urticaria, prurito.

Precauciones:

Se debe tener precaución al administrar en personas con defectos de coagulación. En tratamientos prolongados con Autdol, se recomienda monitorear con un médico para evitar posibles disfunciones hepáticas.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a administrar, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Niños mayores de 1 año:** 0,5 a 1,5 mg de Autdol Gotas por kg de peso al día, o sea, 1 gota por kg de peso 2-3 veces al día.

Modo de empleo:

Por vía oral, acompañado de un vaso de líquido (agua, jugo de frutas) o con las comidas.

Sobredosis:

Las manifestaciones por una sobredosis aguda de Autdol son principalmente una extensión de las reacciones adversas. Pérdida de conciencia, fallas a nivel renal, vómitos y somnolencia.

En casos graves puede producirse convulsiones, hemorragia gástrica. Traslade al paciente a un establecimiento de urgencia para su tratamiento y llevar este folleto de información.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, protegido del calor y fuera del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.

D-ME-E11926-03