

Cam Comprimidos

Composición y presentación:

Cada comprimido contiene:

Betametasona 0,25 mg

Dexclorfeniramina maleato 2,00 mg.

Excipientes: Colorante rojo D&C N°27 lacado, colorante amarillo FD&C N°6 lacado, sodio almidón glicolato, magnesio estearato, lactosa monohidrato, celulosa microcristalina.

Clasificación:

Antialérgico. Corticosteroide.

Indicaciones:

Tratamiento sintomático de alergias, agudas o crónicas, especialmente en sus manifestaciones respiratorias (asma bronquial, rinitis alérgica) o dermatológicas (dermatitis atópica, eczemas), reacciones por medicamentos, reacciones oculares (picazón y enrojecimiento).

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Puede producir somnolencia, evitar la ingesta de bebidas alcohólicas.

Los corticosteroides pueden enmascarar algunos signos de infección. Su uso prolongado puede producir cataratas, glaucoma con posible daño del nervio óptico y fomentar el desarrollo de infecciones oculares debidas a hongos o virus. Durante el tratamiento, los pacientes no se deben vacunar contra la viruela ni ser sometidos a otros procedimientos de inmunización.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a corticosteroides o dexclorfeniramina o a cualquiera de los componentes de la formulación.

- **Absolutas:** No usar en caso de Tuberculosis activa o no activa; herpes simple ocular y cuadros de psicosis aguda.

- **Relativas:** Diverticulitis, úlcera péptica activa o latente, diabetes mellitus, predisposición psicótica. No usar durante el embarazo, salvo absoluta necesidad e indicación médica.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: Antiinflamatorios no esteroidales, diuréticos (Hidroclorotiazida, furosemida), depresores del sistema nervioso central, tranquilizantes, relajantes musculares, inductores del sueño (sedantes), ansiolíticos, antidepresivos (amitriptilina, clomipramina, moclobemida, tranilcipramina), antiepilépticos (carbamazepina, fenitoína). Anticoagulantes orales, Digoxina, rifampicina, isoniazida, Heparina. Evitar administrar CAM simultáneamente con alguno de estos medicamentos sin supervisión directa del médico.

No ingiera bebidas alcohólicas, mientras esté en tratamiento con este medicamento.

Reacciones adversas y efectos indeseables:

El uso de corticoides por vía oral o inyectable requiere de supervisión constante del médico. Este medicamento puede producir algunos efectos que normalmente no requieren atención médica a no ser que los síntomas persistan o sean muy molestos: efectos sedantes (somnolencia), náuseas, vómitos, malestar estomacal, fatiga, cansancio, mareo. Si se presentan otras reacciones adversas, mientras esté en tratamiento con este producto, como: trastornos de la composición sanguíneas (cansancio o debilidad no habituales, dolor de garganta y ronquera, fiebre, hemorragias o hematomas no habituales), reacciones alérgicas (dificultad para respirar, estrechamiento de la garganta, hinchazón de los labios, la lengua o la cara o urticaria), aumento de la presión arterial (dolor de cabeza severo, visión borrosa) o aumento de peso repentino (más de 2 kg en uno o dos días), acuda a su médico.

Precauciones:

Puede agravar posible inestabilidad emocional o las tendencias psicóticas. En tratamientos prolongados, se debe tener presente que los corticoides pueden reactivar enfermedades infecciosas crónicas, de tipo viral o micóticas y la tuberculosis; también pueden suprimir la función de las glándulas suprarrenales y retardar el crecimiento en los niños. Enfermos cardíacos, hipertensos, personas con trastornos hepáticos o renales, deben controlarse periódicamente con el médico. Al terminar el tratamiento, es necesario reducir las dosis gradualmente.

Embarazo y Lactancia: El uso de corticosteroides en mujeres embarazadas o durante el período de lactancia, se debe evaluar cuidadosamente y sólo se justifica si no existe tratamiento alternativo. Ambos medicamentos se excretan por la leche materna; Betametasona atraviesa la barrera placentaria, por lo que se recomienda usar con precaución en el embarazo y durante el período de lactancia sólo si es absolutamente necesario. Este medicamento puede causar somnolencia.

No utilizar en caso de realizar actividades que requieran de atención permanente como conducir vehículos o manejar maquinarias.

Dosis:

El médico debe indicar la dosis y el tiempo de tratamiento adecuado para su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Dosis inicial:** 1 a 2 comprimidos al día. Después de conseguir mejoría, la dosis debe reducirse al nivel mínimo de mantención.
- **Niños de 6 a 12 años:** La dosis usual es de medio comprimido al día, sin exceder los 4 comprimidos al día.
- **Niños de 2 a 6 años:** La dosis inicial es de un cuarto comprimido al día.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral. Los comprimidos tomarlos con agua, leche o con los alimentos para minimizar la irritación gástrica. No sobrepasar las dosis indicadas por el médico.

Sobredosis:

Síntomas: somnolencia intensa, sequedad de boca, nariz y garganta; respiración dificultosa; o bien estimulación, alucinaciones, crisis convulsivas. En caso de aparición de síntomas de sobredosis trasladar a la persona afectada a un centro asistencial de

urgencia para el tratamiento de los síntomas y medidas de mantención adecuadas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original, protegido del calor y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.