

Cinarizina

Cápsulas 75 mg

Composición y presentación:

Cada cápsula contiene:

Cinarizina 75 mg

Excipientes: Povidona, almidón glicolato de sodio, almidón de maíz, estearato de magnesio, talco, lauril sulfato de sodio, manitol, colorante FD&C rojo N° 40, colorante FD&C amarillo N° 6, dióxido de titanio, colorante FD&C amarillo N° 5, colorante FD&C azul N° 1.

Clasificación:

Vasodilatador periférico y cerebral.

Indicaciones:

Tratamiento de mantención para síntomas de trastornos laberínticos, cerebro vasculares, circulatorios periféricos. Profilaxis de cinetosis y migraña.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

Contraindicaciones:

No usar en caso de Porfiria y de hipersensibilidad a la droga.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Alcohol, Ansiolíticos, Benzodiazepinas, Hipnóticos, Barbitúricos: Se potencia el efecto sedante. Heparina: Posible antagonismo parcial del efecto de la heparina. Antiespasmódicos, Antidepresivos tricíclicos: Se potencian los efectos indeseables atropínicos: retención urinaria, constipación, boca seca, visión borrosa.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir en ocasiones; trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico, ardor estomacal, falta de apetito, ligera somnolencia (especialmente al comienzo del tratamiento), cansancio, descoordinación, reacciones alérgicas de la piel y fatiga que desaparecen espontáneamente o al reducir la dosis.

Reacciones adversas:

En ocasiones se han descrito en pacientes de avanzada edad, síntomas extrapiramidales (movimientos involuntarios) durante un tratamiento prolongado, somnolencia persistente, visión borrosa, inquietud o problemas para dormir no habituales; en tales circunstancias, acudir al médico.

Precauciones:

Utilizar con precaución en hipotensión. No ingerir bebidas alcohólicas cuando se administra este medicamento. La Cinarizina puede provocar somnolencia; precauciones

en los operadores de maquinarias y en los conductores de vehículos. Este producto contiene almidón de maíz, precaución en pacientes celíacos.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento adecuados a su caso; no obstante, la dosis usual recomendada es:

- **Trastornos de la circulación cerebral:** 1 cápsula de 75 mg al día.
- **Trastornos de la circulación periférica:** 1 cápsula de 75 mg, diariamente.
- **Trastornos del equilibrio:** 1 cápsula de 75 mg diariamente.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral. Tomar con alimentos, agua o leche para disminuir la irritación gástrica. No tomar más cantidad que la prescrita. Si se sigue una pauta de dosificación regular y omite una dosis: Tomarla lo antes posible, no tomarla si falta poco para la siguiente dosis. Se puede producir sequedad de boca; utilizar caramelos sin azúcar, hielo o un sustituto de la saliva para aliviarla.

Sobredosis:

No se han reportado casos. En caso de sobredosis accidental o intencional, acudir a un establecimiento asistencial.

Llevar el folleto informativo y/o el estuche del medicamento ingerido.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños; protegido del calor y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.