

## **Despex 5 mg Comprimidos Recubiertos**

### **Composición:**

Cada comprimido recubierto contiene:

Desloratadina 5 mg

Excipientes: Almidón de maíz, talco, dióxido silícico coloidal, celulosa microcristalina, recubrimiento polimérico, macrogol, hipromelosa, magnesio estearato, titanio dióxido, simeticona.

### **Indicaciones:**

Alivio rápido de los síntomas asociados con la rinitis alérgica estacional.

### **Clasificación:**

Antihistamínico.

### **Advertencias:**

Usar sólo por indicación médica. Las personas que hayan resultado sensibles a la loratadina, pueden serlo también a este medicamento.

### **Contraindicaciones:**

- No administrar a personas con insuficiencia hepática severa o con antecedentes de reacción alérgica a los componentes de la fórmula.
- **Embarazo y lactancia:** No se recomienda su uso.
- Porfiria.
- No administrar a niños menores de 12 años.

### **Interacciones:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los inhibidores de la monoaminoxidasa (selegilina, moclobemida, furazolidona), Benzodiazepinas, Antidepresivos, Alcohol, cimetidina, fluconazol, ketoconazol.

### **Reacciones adversas o efectos indeseables:**

El uso de este medicamento puede producir algunos efectos que normalmente no requieren atención médica: Fatiga, sequedad de la boca, dolor de cabeza, náuseas, dolor de estómago, aumento del apetito. Si se presenta alguna reacción de hipersensibilidad como ronchas en la piel, o dificultad respiratoria, consulte con el médico.

### **Precauciones:**

Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas. Posible interferencia con las pruebas cutáneas de sensibilidad que utilizan alérgenos; es necesario informar al médico que se está tomando antihistamínicos. En pacientes con falla renal severa, se deberá mantener un control constante.

- **Embarazo y lactancia:** No se recomienda en mujeres embarazadas o durante el período de lactancia.

**Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular; no obstante, la dosis usual recomendada es:

**Dosis Usual:**

- **Adultos y adolescentes (a partir de 12 años):** Un comprimido cada 24 h.

Los comprimidos se podrán administrar con independencia de las comidas.

**Modo de empleo:**

Administrar por vía oral. Tomar los comprimidos, de preferencia con agua; si se produce irritación gástrica, tomarlos con leche o con alimentos.

**Sobredosis:**

En caso de sospecha de sobredosis, o aparición de síntomas como somnolencia y sequedad de la boca, trasladar al enfermo a un centro asistencial para el tratamiento de los síntomas y medidas de mantención adecuadas.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor y la humedad, a no más de 30°C. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.