

Gemfibrozilo

Comprimidos Recubiertos 600 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido recubierto contiene:

Gemfibrozilo 600 mg

Excipientes: Almidón pregelatinizado, polividona, dióxido silícico coloidal, talco, croscarmelosa sódica, magnesio estearato, celulosa microcristalina, poliacrilato dispersión, macrogol, hipromelosa, titanio dióxido, simeticona.

Indicaciones:

Gemfibrozilo está indicado como complemento de la dieta y del manejo no farmacológico como ejercicio, pérdida de peso en los siguientes casos: Tratamiento de hipertrigliceridemia grave con o sin colesterol HDL bajo. Hiperlipidemia mixta cuando las estatinas estén contraindicadas o no sean toleradas por el paciente.

Clasificación:

Antihiperlipidémico.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. El tratamiento debe discontinuarse si al cabo de tres meses no se obtienen reducciones significativas de los niveles lipídicos. No se ha establecido su inocuidad en el embarazo y la lactancia, ni su uso en niños.

Contraindicaciones:

No usar en caso de insuficiencia renal y/o hepática severa.

No usar en caso de presentar hipersensibilidad a gemfibrozilo o a algún excipiente de la formulación.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Anticoagulantes, Sulfonilureas.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: Gases, dolor y sensación de ardor en el estómago. Diarrea, náuseas o vómitos; rubicundez o enrojecimiento facial. Cansancio no habitual.

Reacciones adversas:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto y/o si presenta algún otro efecto o síntoma no descrito en este folleto consulte a su médico: Anemia o leucopenia (tos o ronquera; fiebre o escalofríos; dolor en el costado o en la región inferior de la espalda; micción dolorosa o difícil). Cálculos biliares (dolor fuerte de estómago con náuseas y vómitos). Dolor muscular, cansancio.

Precauciones:

Consultar al médico antes de interrumpir este medicamento. Complementar el tratamiento con una dieta adecuada, recomendada por su especialista. Este producto contiene almidón de maíz, precaución en pacientes celíacos.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es 1.200 mg/día, divididos en dos dosis de 600 mg administrados 30 minutos antes del desayuno y de la cena.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral. Tomar 30 minutos antes del desayuno y de la cena. Es importante no tomar más cantidad ni menos que la prescrita. Si por olvido omite una dosis: tomarla lo antes posible; no tomarla si falta poco tiempo para la dosis siguiente. No duplicar las dosis.

Sobredosis:

No reportados. En caso de sospecha, acudir a un centro asistencial, en donde le realizarán un tratamiento sintomático y de mantención. Llevar este folleto informativo.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.