

Gentamicina

Solución oftálmica 0,3%

Composición y presentación:

Cada mL (25 gotas) contiene:

Gentamicina (como sulfato) 3 mg

Excipientes: Sodio fosfato, cloruro de benzalconio, cloruro de sodio, agua para inyectable.

Clasificación:

Antibiótico.

¿Para qué se usa?:

Infecciones superficiales del ojo causadas por bacterias sensibles, cuando sea posible, determinar la identidad y sensibilidad del germen infectante.

El tratamiento con gentamicina puede iniciarse antes de obtener los resultados de sensibilidad; si el germen causante es resistente a la gentamicina, deberá iniciarse un nuevo tratamiento.

Administración (oftálmica):

Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- 1 a 2 gotas en el (los) ojo(s) afectado(s) cada 4 horas, en casos severos se puede aplicar hasta 2 gotas cada 1 hora.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

Consejo de cómo administrarlo

Debe evitar que la punta del gotario, entre en contacto con la superficie del ojo.

Debe lavarse las manos antes y después de la aplicación del medicamento.

Uso prolongado

El uso prolongado puede provocar el crecimiento de microorganismos que no son sensibles al antibiótico como hongos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico respecto al período de uso señalado.

Precauciones:

El uso de Gentamicina puede inducir la aparición de sobreinfecciones, incluso por hongos. En caso de aparición de sobreinfecciones, debe discontinuarse la medicación y consultar con su médico.

Embarazo

No se ha observado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el feto.

Lactancia

No se ha observado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño.

Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a gentamicina, amikacina, tobramicina, kanamicina.

Interacciones:

Medicamentos

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre el ojo el riesgo de interacciones es bajo.

Efectos adversos:

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: prurito, enrojecimiento, hinchazón, u otros signos de irritación que no se hayan presentado antes.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: picor, visión borrosa.

Sobredosis:

No describas dada la vía de administración.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, protegido del calor y fuera del alcance de los niños. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin antes consultar con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.

D-ME-IVAXH047-05