

Adroxef®
Cefadroxilo
Comprimidos recubiertos 500 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido recubierto contiene:

Cefadroxilo 500,0 mg (como monohidrato)

Excipientes: Almidón glicolato de sodio, estearato de magnesio, lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, macrogol, hipromelosa, colorante FD&C amarillo N°5 lavado, colorante FD&C amarillo N°6 lavado, talco, dióxido de titanio, poliacrilato dispersión, simelicona.

Clasificación:

Antibiótico.

Para qué se usa:

Este medicamento está indicado en el tratamiento de infecciones del tracto urinario, piel, tejidos blandos y tracto respiratorio alto, causados por microorganismos sensibles.

Este medicamento requiere diagnóstico y supervisión médica.

Administración (oral):

Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento adecuado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos y niños que pesan más de 40 kg (88 lbs): Dependiendo de la severidad de la infección, se da una dosis de 500mg a 1g dos veces al día. Como alternativa, en infecciones de la piel, tejidos blandos e infecciones no complicadas del tracto urinario, 1g una vez al día. En tratamiento de amigdalitis y faringitis causado por estreptococos betahemolíticos del grupo A, administrar 500mg cada doce horas o 1g una vez al día, a lo menos por 10 días.

Niños que pesan menos de 40 kg (88lbs): Para tratar infecciones urinarias de la piel en niños se usa 30mg/kg de peso diario o dividido en dosis iguales cada 12 horas. Para tratar faringitis y amigdalitis producidas por estreptococo B hemolítico del grupo A se usa 30 mg/kg de peso diario en una sola dosis o dividido en dosis iguales cada 12 horas, por a lo menos 10 días.

- Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios.

- Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

Consejo de cómo administrarlo

Lo puede tomar antes, durante y después de los comidas, sin problemas. No obstante, si presenta problemas estomacales prefiero su administración junto con las comidas.

Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis. Si utiliza el medicamento por más tiempo que el indicado por su médico puede provocar efectos adversos u otro tipo de infecciones.

Precauciones:**Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con cefadroxilo.

Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de cefadroxilo.

Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

Embarazo

Ese medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico antes de usar ese medicamento si está embarazada.

Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

Precauciones especiales

Si ha tenido colitis ulcerosa, enteritis regional o colitis asociada a antibióticos deberá estar especialmente bajo control médico mientras toma este medicamento.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia o cefadroxilo y otros antibióticos.

Si ha presentado alergia u alguno de los excipientes de la formulación.

Interacciones:**Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: carbenicilina, heparina, warfarina, sulfonpirazona, dipyridamol, pentoxifilina, plicampicina, ticarcilina, probenecid, ácido valproico.

Enfermedades

Usted debe consultar a su médico antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de colitis.

Exámenes de laboratorio

Cefadroxilo puede alterar los resultados de algunas pruebas de laboratorio como creatinina en sangre o glucosa en orina, por lo que si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

Efectos adversos:

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, confusión, escalofríos, hinchazón de la cara o garganta, dolor de cabeza en presencia de luz, sudoración, severo dolor estomacal y calambres, fiebre, diarrea con sangre.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de esos efectos persisten o se intensifican: Diarrea suave, calambres estomacales, dolor en la boca o lengua, picazón o descarga vaginal.

Sobredosis:

Los síntomas de la sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos tales como: dolor abdominal severo, diarrea con sangre, vómitos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente.

Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en lugar seco a menos de 30°C en su envase original, protegido del calor, la humedad y fuera del alcance de los niños. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.