

Budasmal SF
Aerosol para inhalación oral
200 µg/dosis

Composición:

Cada dosis medida del inhalador contiene:

Budesonida 200 µg

Excipientes: Ácido oleico, etanol, 1, 1, 1, 2-tetrafluoretano (HFA)

Clasificación:

Glucocorticoide no halogenado tópico.

Indicaciones:

Tratamiento del asma bronquial crónica, especialmente en pacientes que no responden a la terapia convencional.

Advertencias:

Budesonida no reemplaza a los corticoides orales, los que son necesarios en cirugía, infección, trauma y otras condiciones estresantes.

Cuando se cambia de esteroides sistémicos a Budesonida, algunos pacientes pueden presentar síntomas de discontinuación de corticoides o pueden desencadenarse reacciones alérgicas.

Contraindicaciones:

- Está contraindicado en tuberculosis activa o pasiva, herpes simple ocular, infecciones fúngicas, bacterianas o virales sistémicas, no tratadas.
- Hipersensibilidad a fármaco o alguno de los excipientes.
- Episodios agudos de asma, embarazo y lactancia.

Interacciones:

El uso concomitante de esteroides orales en días alternados con corticoides inhalados pueden aumentar el riesgo de supresión adrenal.

Efectos indeseables:

Ocasionalmente se han descrito casos de ligera irritación de garganta y ronquera.

También se han observado casos de infecciones bucofaríngeas por *Cándida* que normalmente responden a la terapia antifúngica tópica sin interrupción del tratamiento con Budesonida inhalado.

Reacciones adversas:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto consulte a su médico: Si ocurre broncoespasmo después de usar Budesonida inhalado, al terapia debe ser discontinuada y administrar broncodilatadores.

Precauciones:

Con al terapia con Budesonida inhalado, puede desarrollarse infecciones localizadas por Cándida, en la boca o faringe.

Dosis:

El médico debe indicar lo posología y el tipo de tratamiento adecuado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Adultos y niños mayores de 12 años:** 200 μg , una o dos veces al día, con un máximo de 8 inhalaciones.

- **Niños de 6 a 12 años:** 50 μg a 400 μg , dos veces al día.

Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar. Inhalador oral.

Sobredosis:

Los efectos de supresión adrenal se producen sólo con dosis elevadas. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original; protegido del calor, luz solar directa y no congelar ni enfriar. Mantener fuera del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este tratamiento a otra persona.