

Cloranfenicol

Solución oftálmica 0,5%

Composición y presentación:

Cada mL contiene:

Cloranfenicol 5,0 mg

Excipientes: Edetato disódico, polioxil 40 estearato, polietilenglicol, nitrato fenilmercurico, agua purificada.

Clasificación:

Antibiótico.

¿Para qué se usa?:

Este medicamento está indicado en el tratamiento de infecciones oculares superficiales que involucre la conjuntiva y/o córnea causadas por organismos susceptibles.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

Administración (oftálmico):

Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

1 a 2 gotas 4 a 6 veces al día las primeras 72 horas según la severidad del cuadro, las aplicaciones pueden ser distanciadas luego de los dos primeros días. Se recomienda seguir aplicando el medicamento 48 horas después de haber logrado una cura aparente. Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

Consejo de cómo administrarlo

Antes de aplicar este medicamento debe lavarse muy bien las manos.

Luego de aplicar el medicamento en los ojos debe mantenerlos cerrados por 1 a 2 minutos. Debe evitar tocar con la punta del aplicador la zona infectada.

Uso prolongado

No lo use por más o menos tiempo que el señalado por su médico.

Precauciones:

Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

Embarazo

Este medicamento se absorbe en cantidades mínimas, es poco probable que dañe al feto.

Lactancia

Este medicamento no pasa a la leche materna.

Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Interacciones:**Medicamentos**

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre los ojos el riesgo de interacciones es bajo.

Efectos adversos:

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: palidez de la piel, dolor de garganta, fiebre, mareos inusuales.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sensación de ardor o quemazón.

Sobredosis:

No se describen síntomas por vía tópica. En caso de sobredosis por ingestión accidental de la solución oftálmica y se aprecia algún tipo de trastorno, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial, para observación o tratamiento de los síntomas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original y fuera del alcance de los niños. Mantener en refrigeración entre 2° a 8° C, hasta el momento de entregar al usuario; luego mantener entre 15° y 25°C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.

120620-D-ME-IVAXH044-03

Duplicado:

D-ME- IVAXH044-03