

# FICHA TÉCNICA

**Nombre presentación:** Ambilan Bid comprimidos recubiertos 875/125 mg

**Laboratorio:** Laboratorio Chile S.A. (TEVA Pharmaceuticals)

**Principio Activo:** Amoxicilina + Ac Clavulánico

**Acción terapéutica:** Antibiótico betalactámico

**Bioequivalente:** Equivalente Terapéutico

## Indicaciones:

Ambilan Bid se utiliza para el tratamiento de infecciones bacterianas, resistentes a amoxicilina sola (productoras de betalactamasas), pero sensibles a esta asociación, del tracto respiratorio (incluyendo oído y nariz), del tracto urinario, de la piel y tejidos blandos, infecciones abdominales y osteomielitis.

## Contraindicaciones:

AMBILAN BID 875/125 está contraindicado en Pacientes que presenten historial de reacciones alérgicas a cualquier penicilina o derivado, al ácido Clavulánico, o a cualquiera de los excipientes contenidos en la formulación. Pacientes con historial de ictericia colestásica o disfunción hepática asociada con el uso de medicamentos que contengan amoxicilina y/o ácido Clavulánico. Pacientes con antecedentes de una reacción de hipersensibilidad inmediata grave (p. ej., anafilaxia) a otro antibiótico betalactámico (p. ej., una cefalosporina, un carbapenem o un monobactámico)

## Reacciones adversas:

**Las reacciones adversas reportadas más frecuentemente son diarrea / heces blandas, náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, urticaria y vaginitis.**

**Otras reacciones menos frecuentes son: malestar abdominal, flatulencia, cefalea.**

**Otras reacciones adversas, que se han asociado a la administración de antibióticos del tipo ampicilina son: indigestión, gastritis, estomatitis, glositis, lengua oscurecida, candidiasis muco cutánea, enterocolitis, colitis hemorrágica / pseudomembranosa, incremento moderado de las SGOT, SGPT, bilirrubina sérica y fosfatasa alcalina, disfunción hepática (incluyendo hepatitis e ictericia colestásica), anemia, trombocitopenia, trombocitopenia purpúrea, eosinofilia, leucopenia, agranulocitosis. Se ha descrito reacciones de hipersensibilidad que incluyen prurito, angioedema, eritema multiforme, pustulosis exantemática aguda generalizada, vasculitis, dermatitis. Otros efectos adversos reportados son los de tipo neurológico, donde se describe agitación, ansiedad, cambios de ánimo, confusión convulsiones, mareos, insomnio, hiperactividad reversible.**

**Raramente se ha reportado nefritis intersticial, hematuria, cristaluria y decoloración dental.**

## Dosificación y Administración:

1 comprimido de Ambilan BID (Amoxicilina 875 mg y Ácido Clavulánico 125 mg) cada 12 horas. Los tratamientos no deben durar más de 14 días.

## Composición:

Cada comprimido recubierto contiene:

Amoxicilina (como trihidrato): 875 mg

Ácido Clavulánico (como clavulanato de potasio): 125 mg

Excipientes (c.s.): Dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, Glicolato sódico de almidón de papa, Celulosa microcristalina, Hipromelosa, Macrogol, Dióxido de titanio, Dimeticona.

## Presentación:

**Ambilan Bid comprimidos recubiertos 875/125 mg en envases de 14 comprimidos.**

**PRECIO DE SALIDA: \$ 23.500.- Precio Venta a Público sugerido.**

# FICHA TÉCNICA

**Nombre presentación:** Ambilan Bid comprimidos recubiertos 875/125 mg

**Laboratorio:** Laboratorio Chile S.A. (TEVA Pharmaceuticals)

**Principio Activo:** Amoxicilina + Ac Clavulánico

**Acción terapéutica:** Antibiótico betalactámico

**Bioequivalente:** Equivalente Terapéutico

## Indicaciones:

Ambilan Bid se utiliza para el tratamiento de infecciones bacterianas, resistentes a amoxicilina sola (productoras de betalactamasas), pero sensibles a esta asociación, del tracto respiratorio (incluyendo oído y nariz), del tracto urinario, de la piel y tejidos blandos, infecciones abdominales y osteomielitis.

## Contraindicaciones:

AMBILAN BID 875/125 está contraindicado en Pacientes que presenten historial de reacciones alérgicas a cualquier penicilina o derivado, al ácido Clavulánico, o a cualquiera de los excipientes contenidos en la formulación. Pacientes con historial de ictericia colestásica o disfunción hepática asociada con el uso de medicamentos que contengan amoxicilina y/o ácido Clavulánico. Pacientes con antecedentes de una reacción de hipersensibilidad inmediata grave (p. ej., anafilaxia) a otro antibiótico betalactámico (p. ej., una cefalosporina, un carbapenem o un monobactámico)

## Reacciones adversas:

**Las reacciones adversas reportadas más frecuentemente son diarrea / heces blandas, náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, urticaria y vaginitis.**

**Otras reacciones menos frecuentes son: malestar abdominal, flatulencia, cefalea.**

**Otras reacciones adversas, que se han asociado a la administración de antibióticos del tipo ampicilina son: indigestión, gastritis, estomatitis, glositis, lengua oscurecida, candidiasis muco cutánea, enterocolitis, colitis hemorrágica / pseudomembranosa, incremento moderado de las SGOT, SGPT, bilirrubina sérica y fosfatasa alcalina, disfunción hepática (incluyendo hepatitis e ictericia colestásica), anemia, trombocitopenia, trombocitopenia purpúrea, eosinofilia, leucopenia, agranulocitosis. Se ha descrito reacciones de hipersensibilidad que incluyen prurito, angioedema, eritema multiforme, pustulosis exantemática aguda generalizada, vasculitis, dermatitis. Otros efectos adversos reportados son los de tipo neurológico, donde se describe agitación, ansiedad, cambios de ánimo, confusión convulsiones, mareos, insomnio, hiperactividad reversible.**

**Raramente se ha reportado nefritis intersticial, hematuria, cristaluria y decoloración dental.**

## Dosificación y Administración:

1 comprimido de Ambilan BID (Amoxicilina 875 mg y Ácido Clavulánico 125 mg) cada 12 horas. Los tratamientos no deben durar más de 14 días.

## Composición:

Cada comprimido recubierto contiene:

Amoxicilina (como trihidrato): 875 mg

Ácido Clavulánico (como clavulanato de potasio): 125 mg

Excipientes (c.s.): Dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, Glicolato sódico de almidón de papa, Celulosa microcristalina, Hipromelosa, Macrogol, Dióxido de titanio, Dimeticona.

## Presentación:

**Ambilan Bid comprimidos recubiertos 875/125 mg en envases de comprimidos.**

**PRECIO DE SALIDA: \$23.500.- Precio Venta a Público sugerido.**