

Hidrocortisona Comprimidos 20 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido contiene:

Hidrocortisona 20,00 mg

Excipientes: Polividona, almidón glicolato de sodio, celulosa microcristalina, lactosa monohidrato, magnesio estearato.

Clasificación:

Corticosteroide.

Indicaciones:

Como terapia de reemplazo en insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Después de suspender la medicación, se puede producir el síndrome de deprivación caracterizado por dolor abdominal o de espalda, mareos, desmayos, fiebre, pérdida prolongada del apetito, dolor muscular o articular, sensación de falta de aire, dolores de cabeza inexplicables y continuos, cansancio o debilidad no habituales, reaparición de los síntomas de la patología tratada. Si se encuentra en alguno de estos casos, se recomienda visitar a su médico.

Contraindicaciones:

No usar en caso de presentar úlcera gastroduodenal activa, osteoporosis severa. Herpes zóster activo. Tuberculosis activa sin tratamiento. Alteraciones psiquiátricas. Glaucoma. Hipertensión arterial moderada.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con: Diuréticos, Hipoglicemiantes, Anticonvulsivos, Digitálicos, Antiácidos y Calcio.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: náuseas, vómitos, aumento del apetito, indigestión, nerviosismo o inquietud, dificultad para dormir.

Reacciones adversas:

La administración crónica de glucocorticoides a dosis fisiológicas para sustitución, raramente produce efectos adversos, generalmente se producen durante el uso a largo plazo. Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, acuda a su médico: acné u otros problemas cutáneos (rash cutáneo o urticaria), hiperacidez gástrica, dolor en la cadera o el hombro. Síndrome de Cushing (rostro redondeado o cara de luna). Edema (hinchazón de los pies o parte inferior de las piernas). Desequilibrio endocrino (irregularidades en la menstruación).

Precauciones:

Evitar uso en el embarazo, durante la lactancia y en niños. Los corticosteroides pueden agravar la inestabilidad emocional o las tendencias psicóticas. Tratamiento prolongados pueden provocar una insuficiencia suprarrenal, discontinuar el tratamiento gradualmente.

Dosis:

La dosis que su médico le indique. Las dosis dependen de la patología y gravedad del proceso. La dosis habitual es de 20 a 30 mg/día.

Modo de empleo:

Se administra por vía oral. Tomarlo con alimento para minimizar la irritación gastrointestinal; el alcohol puede potenciar los efectos ulcerogénicos de este medicamento. Para el tratamiento de los efectos gastrointestinales; se recomienda la administración de antiácidos.

Sobredosis:

Los síntomas corresponden a los descritos en las reacciones adversas pero de forma más exagerada.

Trasladar al enfermo a un centro asistencial para un tratamiento sintomático y de mantención adecuado. Los casos de toxicidad aguda o muerte son raros. La sobredosis crónica, se trata reduciendo la dosis o suspendiendo el corticosteroide.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.