

## **Ibuprofeno**

### **Suspensión oral pediátrica 100 mg/5 ml**

#### **Composición y presentación:**

Cada 5 mL de suspensión contiene:

Ibuprofeno 100 mg

Excipientes: Celulosa microcristalina, carmelosa sódica, goma xantano, polisorbato, sorbitol, sacarina sódica, metilparabeno, colorante FD&C amarillo N° 6, colorante FD&C rojo N° 40, esencia de granadina, esencia de fresa, agua purificada.

#### **Indicaciones:**

Tratamiento sintomático en procesos inflamatorios y dolorosos leves a moderados y en el síndrome febril en pacientes mayores de 6 meses.

#### **Clasificación:**

Analgésico-antiinflamatorio. Antipirético.

#### **Advertencias:**

Úsese sólo por indicación médica. La administración de este medicamento en los niños, debe ser hecha por un adulto. En tratamientos prolongados, controlar las funciones renal, hepática, cardíaca y la coagulación sanguínea.

#### **Contraindicaciones:**

No usar en caso de presentar hipersensibilidad al Ácido acetilsalicílico, Ibuprofeno y/o a otros analgésicos-antiinflamatorios. No administrar en pacientes ulcerosos, con insuficiencia renal o hepáticas graves.

#### **Interacciones:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Sales de Litio. Diuréticos que eliminan potasio (Furosemida, Tiazidas) y Diuréticos ahorradores de potasio (Espironolactona, Triamterena) pueden producir hiperpotasemia. Antihipertensivos y Corticoides en general. Antidiabéticos, Anticoagulantes. No se aconseja la asociación con estos medicamentos sin la supervisión constante del médico.

#### **Reacciones adversas:**

El uso de este medicamento puede producir algunos efectos indeseables que normalmente no requieren atención médica. como malestar estomacal: náuseas, vómitos, diarrea u otras alteraciones digestivas pasajeras.

Si se presentan otras reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto suspenda el tratamiento y acuda a su médico: Reacciones de hipersensibilidad (edema, erupción cutánea, picazón), crisis de asma, vómitos o deposiciones sanguinolentas, dolor de estómago, perturbaciones del tránsito intestinal.

**Precauciones:**

Los pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico, pueden ser sensibles también a otros antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios pueden producir irritación o ulceración de la mucosa gástrica. Este producto contiene tartrazina, precaución en pacientes alérgicos a este colorante.

**Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es: En niños 20 mg por kg de peso al día repartidos en 3 o 4 dosis cada 6-8 horas.

**Modo de empleo:**

Administrar por vía oral.

**Sobredosis:**

En caso de sospecha de sobredosis o aparición de síntomas como letargo, somnolencia, hemorragia digestiva, convulsiones; trasladar al paciente a un centro asistencial de urgencia.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.