

Lactil

Polvo liofilizado para solución oral 1 g

Composición y presentación:

Cada sobre contiene:

Lactobacillus casei variedad rhamnosus como polvo liofilizado 1 g, equivalente a 1×10^8 gérmenes vivos/gramo

Envase con 6 sobres.

Clasificación:

Restaurador de la flora intestinal.

Indicaciones:

Lactil se usa para la prevención y tratamiento sintomático de enfermedades diarreicas de diferente etiología, como complemento de la rehidratación.

Precauciones y advertencias:

En niños menores de 2 años, todas las diarreas pueden ser graves, por lo que se hace necesario consultar siempre al médico.

En niños mayores: Si la diarrea persiste por más de dos días, consultar con el médico ya que puede ser necesario iniciar un tratamiento de rehidratación.

En casos de diarreas severas y deposiciones con sangre o mucus, o con fiebre y vómitos consultar con el médico y en el intertanto, suministrar soluciones de sales de rehidratación para prevenir la deshidratación. La deshidratación se manifiesta en los niños por pérdida de peso, decaimiento, piel reseca y llanto sin lágrimas, lo que indica que se debe acudir a un establecimiento de urgencia.

No es necesaria su adaptación posológica en caso de insuficiencia renal o hepática, ni en personas de edad.

Contraindicaciones:

No tome este medicamento si Ud. ha sufrido anteriormente de reacciones alérgicas con este producto; si estas manifestaciones aparecen durante el tratamiento, suspender el medicamento y consultar con el médico.

No tome este medicamento por más de 2 días sin indicación del médico; si los síntomas persisten o empeoran, consultar al médico.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse cuando se administra junto con otros. Informe a su médico o al farmacéutico acerca de todos los medicamentos que está usando.

Efectos adversos:

Los medicamentos pueden producir también algunos efectos no deseados, que desaparecen espontáneamente y que normalmente, no requieren atención médica: Molestias gastrointestinales (incremento de gases intestinales), reacciones alérgicas leves.

Forma de administración y dosis:

El contenido de los sobres debe reconstituirse en agua fría.

- **Dosis:** La que su médico le indique. Las dosis recomendadas para adultos y para niños son de 1 a 4 sobres en el día. Tomar de preferencia en horarios alejados de las comidas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Asegúrese que al eliminar el medicamento. no será encontrado y usado por los niños.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.