

## **Lorazepam**

### **Comprimidos 2 mg**

#### **Composición y presentación:**

Cada comprimido contiene:

Lorazepam 2,0 mg

Excipientes: Celulosa microcristalina, lactosa, sodio almidón glicolato, magnesio estearato.

#### **Clasificación:**

Ansiolítico.

#### **Indicaciones:**

Este medicamento es utilizado como tratamiento para el manejo de las alteraciones ansiosas o para alivio de corto plazo de los síntomas de ansiedad o la ansiedad asociada con síntomas depresivos, a estados psicóticos y en la depresión severa que requiera una terapia adicional.

#### **Administración (oral):**

##### **Rango y frecuencia**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 2 a 6 mg diarios en dosis divididas.

##### **Consejo de cómo administrarlo**

Se recomienda que tome el medicamento junto a las comidas para evitar problemas estomacales.

##### **Uso prolongado**

En el tratamiento de insomnio se recomienda evitar períodos de tratamiento superiores a 2 o 3 semanas, por lo que usted debe tomarlo solamente por el período de tiempo señalado por su médico. El uso prolongado de este medicamento causa dependencia, la suspensión del medicamento no debe ser brusca, ya que puede producir un síndrome de abstinencia caracterizado por ansiedad, agitación, temblores, insomnio.

#### **Precauciones:**

##### **Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe tener especial precaución si se encuentra en tratamiento con lorazepam.

##### **Consumo de alcohol**

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos, principalmente a nivel del sistema nervioso central (dificultad para concentrarse, depresión y otros).

##### **Manejo de vehículos**

Este medicamento disminuye su estado de alerta y su capacidad de reaccionar frente a imprevistos, por lo tanto evite manejar vehículos, maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad de riesgo mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento.

##### **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

##### **Lactancia**

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o si debe dejar de amamantar.

##### **Lactantes y niños**

No se recomienda utilizar este medicamento en niños menores de 12 años, ya que los niños son más sensibles a los efectos adversos del medicamento.

El uso de lorazepam en niños es posible sólo en las condiciones determinadas por su pediatra.

##### **Precauciones especiales**

No debe interrumpir bruscamente el tratamiento, su médico le debe indicar la forma en que debe ir reduciendo la dosis a tomar.

Se puede producir olvido de acontecimientos recientes por efecto de este medicamento. Nunca se deben tomar dosis mayores que las recomendadas por su médico. Mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento no debe consumir alcohol y debe evitar el consumo de cafeína.

**Contraindicaciones:**

- Si ha presentado síntomas de alergia a lorazepam o cualquier otra benzodiazepina.
- Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.
- No debe usar este medicamento si padece de miastenia gravis, o ha sufrido recientemente de intoxicación etílica aguda, coma o shock.

**Interacciones:****Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta.

En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: anticonceptivos orales, alcohol etílico, aminofilina, clozapina, levodopa, loxapina, ácido valproico, zidovudina, depresores del sistema nervioso central como clorfenamina, fenobarbital, pseudoefedrina, medicamentos para el resfrío, etc.

**Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, glaucoma, antecedentes de drogodependencia, miastenia gravis, hiperactividad, depresión, apnea de sueño, porfiria.

**Exámenes de laboratorio**

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

**Efectos adversos:**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para concentrarse, depresión, alucinaciones, disminución de la presión arterial, confusión, debilidad muscular, rash o picazón de la piel, sequedad de garganta, fiebre y escalofríos, úlceras en la garganta o la boca, moretones o hemorragias inusuales, fatiga extrema, ojos o piel de color amarillo.

**- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sedación, vértigo, debilidad, inestabilidad.

**Sobredosis:**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: somnolencia extrema, confusión, dificultad para respirar, reflejos más lentos, pobre coordinación, temblor, pérdida de la conciencia, coma. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente.

Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener en su envase original, protegido del calor, humedad y fuera del alcance de los niños. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.