

Metformina Clorhidrato Comprimidos 850 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido contiene:

Metformina Clorhidrato 850 mg

Excipientes: Povidona, crospovidona, celulosa microcristalina, ácido esteárico.

Indicaciones:

Como monoterapia, está indicado como coadyuvante de la dieta para disminuir la glicemia en pacientes con diabetes tipo II cuya hiperglicemia puede ser controlada solamente con la dieta. Puede ser empleada conjuntamente con una sulfonilurea o insulina para mejorar el control glicémico.

Clasificación:

Hipoglicemiante oral.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Puede disminuir la absorción de la vitamina B12.

Contraindicaciones:

No usar en insuficiencia hepática, respiratoria o cardíaca grave; insuficiencia renal, infarto al miocardio. No administrar a diabéticos mayores de 65 años en mal estado general o muy debilitados. En casos de diabetes complicada por cetoacidosis, coma diabético, intoxicación etílica, embarazo y lactancia.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Alcohol, Beta-bloqueadores incluidos los oftálmicos (Propranolol, Atenolol, Acebutolol), Anticoagulantes (Dicumarol), Diuréticos, Anticonceptivos orales, Sulfonamidas, Cotrimoxazol, Miconazol, Fenilbutazona, Salicilatos, Corticosteroides, Rifampicina, Cloranfenicol. Evitar la asociación entre hipoglicemiantes orales y alguno de estos productos sin supervisión médica. (Puede requerirse ajuste de las dosis de metformina).

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: estreñimiento, diarrea, mareos, dolor de cabeza, aumento o pérdida del apetito, náuseas, vómitos, sensación de plenitud en el estómago.

Reacciones adversas:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este medicamento, consulte a su médico: náuseas, diarrea y trastornos respiratorios (posible acidosis láctica).

Precauciones:

No ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento. Evitar la administración en personas con desnutrición importante, con antecedentes de alcoholismo o bajo condiciones que predispongan a una disminución del oxígeno en los tejidos como: disfunción pulmonar crónica, infecciones severas. Visitar al médico regularmente y controlar los niveles de glucosa en sangre para comprobar la evolución del tratamiento.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es: Se administra oralmente en dosis inicial de 850 mg por día con el desayuno. La dosis usual es 1 comprimido de 850 mg dos veces al día, con el desayuno y la cena.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral. Tomar los comprimidos con las comidas.

Sobredosis:

Síntomas de sobredosis: Hipoglucemia caracterizada por ansiedad, escalofríos, sudor frío, hambre excesiva, latidos cardíacos rápidos y debilidad. Tratar esta hipoglicemia con la ingestión de azúcar o caramelos. En caso de síntomas más severos trasladar a la persona afectada a un centro asistencial de urgencia, para un tratamiento sintomático y de mantención.

Condiciones de mantenimiento:

Mantener fuera del alcance de los niños, a no más de 30°C; en su envase original; protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.