

Nastifrin

Gotas

Composición y presentación:

Cada mL de gotas orales, con sabor a fresas contiene:

Clorfenamina maleato 1 mg

Pseudoefedrina sulfato 30 mg

Excipientes: Glicerina, sorbitol, esencia de cerezas, metilparabeno, sacarina sódica dihidrato, agua purificada.

Envase frasco gotario de 15 mL de gotas orales.

Indicaciones:

Resfrío común, gripe, rinofaringitis viral, otitis. Congestión de oídos (tubotimpánica), laríngea, ocular y/o bronquial.

Clasificación:

Antihistamínico. Descongestionante.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

Contraindicaciones:

No usar en personas con intolerancia a los antihistamínicos o a otros simpaticomiméticos.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Barbitúricos, Antidepresivos, Inhibidores de la monoaminoxidasa (I-MAO), Alcohol, Eritromicina.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: sedación, somnolencia, náuseas, vómitos, palidez, visión borrosa.

Reacciones adversas:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto y/o si presenta algún otro efecto o síntoma no descrito en este folleto consulte a su médico: Pérdida del apetito, euforia, insomnio, convulsiones, alucinaciones, latidos cardíacos irregulares y lentos, aumento de la presión arterial. Alteraciones sanguíneas (dolor de garganta, fiebre, hemorragia).

Precauciones:

Administrar con precaución en pacientes hipertensos, en mujeres embarazadas y durante el período de lactancia, en predisposición a la retención urinaria, glaucoma. Este medicamento no puede ser administrado si se va a someter a examen de alérgenos (como test cutáneo) porque puede dar falso negativo y enmascarar reacciones alérgicas propias. Este producto puede producir insomnio, precaución en personas que requieran estar en estado de alerta. Este producto contiene sorbitol, precaución en pacientes diabéticos

Dosis:

La dosis debe ser adaptada por el médico según edad, peso y estado del paciente.

- **Hasta 3 meses:** 5 gotas, 3 a 4 veces por día.

- **De 4 a 6 meses:** 10 gotas, 3 a 4 veces por día.

- **De 13 a 18 meses:** 20 gotas, 3 a 4 veces por día.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral, tomar las gotas con agua, leche o alimentos para disminuir la irritación gástrica. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas o fármacos depresores del SNC.

Sobredosis:

No existe antídoto específico, por lo que en caso de sobredosis o reacciones adversas intensas, trasladar al enfermo a un centro asistencial donde le realizarán un tratamiento sintomático y de mantención, que posiblemente incluye: inducción del vómito o lavado gástrico. Llevar este folleto de información.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original a temperatura ambiente. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.