

## **Nistatina-Metronidazol Óvulos Vaginales**

### **Composición y presentación:**

Cada óvulo vaginal contiene:

Nistatina 100.000 U.I.

Metronidazol 500 mg

Excipientes: Masa para óvulos.

### **Indicaciones:**

Vaginitis e infecciones urogenitales causadas por Tricomonas y/o Cándida albicans.

### **Clasificación:**

Antimicótico y Tricomonicida.

### **Advertencias:**

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

### **Contraindicaciones:**

No usar en caso de presentar hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Durante el primer trimestre del embarazo. Enfermedad activa del SNC.

### **Interacciones:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Dada la forma de administración, óvulos, no se han descrito interacciones de importancia por esta vía.

### **Efectos indeseables y reacciones adversas:**

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: irritación vaginal, escozor, prurito. Consultar a su médico sólo si estos efectos persisten, se intensifican o son molestos.

### **Precauciones:**

Usar sólo si es absolutamente necesario durante el 2º y 3º trimestre del embarazo.

### **Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada: 1 óvulo vaginal cada 12 horas o cada 24 horas.

### **Modo de empleo:**

Introducir los óvulos profundamente en la vagina todas las noches por 7 a 14 días. El tratamiento se puede complementar con la aplicación de Nistatina ungüento en la mucosa externa y en la vulva. El tratamiento debe continuar incluso durante la menstruación. Utilizar medidas higiénicas para controlar las fuentes de reinfección. Para evitar recaídas continuar el tratamiento al menos por 48 horas después de desaparecidas las molestias.

### **Sobredosis:**

No se han descrito casos para esta vía de administración.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, a menos de 30°C, protegido del calor, humedad y la luz. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.