

Piritinol

Comprimidos recubiertos 200 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido recubierto contiene:

Piritinol diclorhidrato 200 mg

Excipientes: Povidona, dióxido de silicio coloidal, lactosa monohidrato, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, polímero catiónico de dimetilaminoetil metacrilato, talco, dióxido de titanio, macrogol.

Clasificación:

Neurotrófico y psicoenergizante.

Indicaciones:

Síntomas de insuficiencia cerebral por trastornos del metabolismo y la circulación cerebral, tales como trastornos de la memoria, concentración y disminución de la actividad e interés por el medio.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

Contraindicaciones:

No usar en personas con: insuficiencia renal, nefropatía con proteinuria y hematuria (presencia de proteínas y sangre en orina). Insuficiencia hepática. Problemas hematológicos. Lupus eritematoso diseminado, dermatosis severa. Miastenia gravis. Antecedentes de reacciones graves producidos por derivados tiólicos (D-Penicilamina, Piritinol). No administrar a mujeres embarazadas y durante el período de lactancia.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. No se han descrito interacciones con otros productos.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: trastornos del sueño, mayor excitabilidad, pérdida del apetito, dolor de cabeza, cansancio.

Reacciones adversas:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este medicamento, consulte a su médico: reacciones alérgicas, principalmente cutáneas; aumento de la temperatura, trastornos gastrointestinales (náuseas) y hepáticos (incremento de las transaminasas, cálculos). Dolor de las articulaciones.

Precauciones:

Los pacientes con artritis reumatoide muestran una mayor tendencia a las reacciones adversas al estar en tratamiento con este medicamento. Este tipo de pacientes deberán hacerse exámenes periódicos de sangre y orina. En caso de presentarse los efectos secundarios, debe discontinuarse el tratamiento y consultar con un médico. Este producto en su presentación de 100 mg contiene tartrazina, precaución en pacientes alérgicos a este colorante. En ambas presentaciones contiene lactosa monohidrato, precaución en pacientes diabéticos.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento apropiado a su caso en particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Adultos:** Iniciar con 200 mg; tres veces al día, durante las primeras semanas. Posteriormente, la mitad de la dosis.
- **Niños:** 100 mg; dos o tres veces al día. Tratamiento mínimo de 6 a 8 semanas, para obtener un efecto persistente.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral, tomar con un vaso de agua.

Sobredosis:

Síntomas de sobredosis: Exacerbación de las reacciones adversas. En caso de sobredosis accidental, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial de urgencia, para un tratamiento asistencial de urgencia, llevar este folleto de información.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños; protegido del calor y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.