

Ranitidina 300 mg Comprimidos recubiertos

Composición y presentación:

Cada comprimido recubierto contiene:

Ranitidina 300 mg (como clorhidrato)

Excipientes: Lactosa monohidrato, almidón de maíz, povidona, dióxido silícico coloidal, talco, magnesio estearato, almidón glicolato de sodio, lauril sulfato de sodio, celulosa microcristalina, titanio dióxido, macrogol, polímero catiónico de dimetil-aminoetil metacrilato, y ésteres neutros del ácido metacrílico.

Clasificación:

Antiulceroso.

¿Para qué se usa?:

Este medicamento es usado en:

- El tratamiento de úlcera duodenal activa y terapia de mantención para disminuir recurrencia de ésta.
- Tratamiento de úlcera gástrica benigna activa y terapia de mantención para disminuir recurrencia de ésta.
- Esofagitis de reflujo asociado a hipersecreción gástrica (síndrome de Zollinger-Ellison).

Administración (oral):

Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Adultos:** 150 mg, dos veces al día; o bien 300 mg en la noche.
- **Mantención:** 150 mg/día. (Dosis máxima: 900 mg/día). Administración oral cada 12 o 24 horas.

Consejo de cómo administrarlo

Se deben tomar preferentemente con las comidas o al acostarse, evitando alimentos que causen irritación.

Uso prolongado

Debe tomar este medicamento bajo control médico.

Precauciones:

Mayores de 60 años

Las reacciones adversas pueden ser más comunes y más severas en pacientes ancianos.

Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol, ya que este puede aumentar las molestias estomacales.

Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y/o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

Embarazo

Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe señalar al médico, que está embarazada o puede estarlo, antes de usar este medicamento.

Lactancia

Este medicamento pasa a través de la leche materna, puede producir acidez estomacal o excitación en los lactantes, por lo que no debe utilizarlo durante la lactancia.

Lactantes y niños

No es recomendable utilizar en niños. Su pediatra debe evaluar el riesgo/beneficio de su administración.

Precauciones especiales

El tabaco de los cigarrillos disminuye la actividad de la ranitidina, por ello es preferible que no fume cuando este tomando el medicamento.

Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a la ranitidina o a cimetidina, famotidina, nizatidina y roxatidina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Interacciones:

Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta.

En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: antiácidos, fluoxetina, ácido acetilsalicílico, propranolol, cafeína, diazepam, glipizida, ketoconazol, lidocaína, fenitoína, procainamida, teofilina o warfarina.

Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de alguna alteración renal o inmunológica.

Alimentos

No debe consumir bebidas carbonatadas (gaseosas), frutas y jugos ácidos, bebidas que contengan cafeína y otras comidas y jugos ácidos que puedan irritar el estómago o interferir con la acción terapéutica de ranitidina.

Efectos adversos:

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: palpitations, disminución en el ritmo del corazón, hemorragias inusuales, fiebre, escalofríos, aparición de infecciones.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: dolor de cabeza, fatiga, mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, constipación, visión borrosa, disminución en el deseo o función sexual, temporal pérdida de cabello, insomnio, enrojecimiento de la piel, palidez.

Sobredosis:

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: vómitos, diarrea, problemas respiratorios, dificultad para hablar, taquicardia, delirio.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños, protegido del calor, la luz y la humedad. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.