

Timolol 0,5%

Solución oftálmica

Composición y presentación:

Cada mL (25 gotas) contiene:

Timolol (como maleato) 5,0 mg

Excipientes: Sodio fosfato, cloruro de benzalconio, agua purificada estéril.

0,2 mg/0,04 mL (1 gota)

Indicaciones:

Tratamiento del glaucoma de ángulo abierto, glaucoma secundario, glaucoma afáquico, hipertensión intraocular.

Clasificación:

Antiglaucomatoso.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

Contraindicaciones:

No usar en caso de presentar hipersensibilidad a los betabloqueadores (acebutolol, atenolol, labetalol, propranolol). Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Asma bronquial, Bradicardia sinusal. Insuficiencia cardiaca descompensada. Bloqueo aurículo ventricular. Afección del iris (iritis aguda). Úlcera corneal activa. Queratitis dendrítica.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Amiodarona, hipoglicemiantes orales, agentes hipotensores del tipo betabloqueadores orales o bloqueantes de los canales de calcio. Las interacciones pueden llegar a tener relevancia si este producto oftálmico alcanza a absorberse significativamente e ingresa a la circulación. La administración conjunta con alguno de estos medicamentos debe hacerse cuidadosamente.

Reacciones adversas:

El uso de este medicamento puede producir efectos adversos que normalmente no requieren atención médica: Lagrimeo, irritación ocular transitoria o alteración de la visión al administrar las gotas.

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto consulte a su médico: Enrojecimiento, irritación, picazón y/o hinchazón de los ojos y párpados, caída del párpado superior, diplopía (visión doble), conjuntivitis. Si se llega a absorber este producto significativamente, puede producir bradicardia, mareos, somnolencia, dificultad respiratoria.

Precauciones:

Administrar con precaución y bajo estricto control médico a mujeres embarazadas y que se encuentren amamantando. Los niños y pacientes geriátricos pueden ser especialmente

sensibles a los efectos de los betabloqueadores por vía oftálmica, incrementándose el riesgo de efectos secundarios.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Una gota dos veces al día.

Modo de empleo:

Aplicar las gotas dentro de los ojos. Evitar la contaminación de la punta del envase, para lo cual, el extremo del aplicador no debe tocar ninguna superficie; mantener el envase con el cierre ajustado. No utilizar más cantidad de medicamento que la prescrita (normalmente el saco conjuntival sólo tiene capacidad para 1 gota).

Sobredosis:

Si se produce sobredosis por vía oftálmica enjuagar inmediatamente los ojos con agua. Si accidentalmente la solución se ingiere por vía oral, trasladar al enfermo a un centro asistencial para realizar el tratamiento de los síntomas y de mantención con monitoreo de las funciones comprometidas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños, protegido del calor, la luz y la humedad. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.

120319-IVAXH061-05