

## **Tonotensil D**

### **Comprimidos recubiertos**

#### **Composición y presentación:**

Cada comprimido contiene:

Lisinopril (como dihidrato) 20 mg

Hidroclorotiazida 12,5 mg

Excipientes: Calcio fosfato, almidón pregelatinizado, manitol, almidón de maíz, colorante FD&C azul N°1 lacado, colorante FD&C amarillo N°5 lacado, almidón glicolato de sodio, magnesio estearato, lactosa monohidrato, celulosa microcristalina.

#### **Indicaciones:**

Tratamiento de la hipertensión arterial.

#### **Clasificación:**

Antihipertensivo.

#### **Advertencias:**

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

En personas sensibles pueden producirse inflamaciones de las mucosas de la boca y garganta (angioedema) o reacciones anafilactoideas graves durante la terapia. En tal caso, la medicación debe ser discontinuada y los síntomas tratados apropiadamente en un establecimiento de salud, hasta que se normalicen los signos y desaparezcan los síntomas.

Durante el segundo y tercer trimestre de embarazo puede causar daño o incluso muerte del feto en desarrollo.

#### **Contraindicaciones:**

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes o con historial de angioedema relacionado con tratamientos previos con inhibidores de ECA (captopril, enalapril, lisinopril).

El componente Hidroclorotiazida está contraindicado en pacientes con anuria o hipersensibilidad a otros derivados de las sulfonamidas.

Está contraindicado en embarazo y lactancia.

#### **Interacciones:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos:

- La administración concomitante con litio puede llevar a signos de sobredosis de éste.
- Corticoesteroides y ACTH intensifican la pérdida de electrolitos, particularmente de potasio.
- Tratamiento simultáneo con analgésicos-antiinflamatorios puede reducir los efectos antihipertensivos del producto.
- **Hipoglicemiantes:** Puede ser necesario ajustar la dosis.
- **Suplementos de potasio:** Riesgo de aumento de la concentración de potasio en la sangre.

#### **Efectos indeseables:**

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren de atención médica: mareos, dolor de cabeza, tos, fatiga; todos ellos han sido leves y pasajeros; sólo en algunos casos se ha debido suspender la medicación.

#### **Reacciones adversas:**

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto consulte a su médico: Desmayo al levantarse. Raramente se han producido reacciones graves como inflamación de las mucosas de la boca y garganta, y anafilaxis. Otros

efectos adversos: Prurito, inflamaciones y manchas en la piel; dolores de estómago, constipación y palpitaciones.

### **Precauciones:**

- Pacientes sensibles a los inhibidores de la ECA o a los diuréticos tiazídicos pueden presentar reacciones graves de hipersensibilidad a esta combinación (inflamación de las mucosas de la boca y garganta, y anafilaxis).
- En pacientes con insuficiencia renal, deben controlarse los electrolitos, creatinina sérica y, uremia, para evaluar la función renal.
- Tomar medidas para prevenir el embarazo.
- **Insuficiencia cardíaca congestiva:** Puede producirse oliguria, azotemia y daño renal agudo.

### **Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es:

- En adultos, inicialmente se recomienda 1 comprimido cada 24 horas; la primera dosis, tomarla de preferencia al acostarse. Si es necesario, puede aumentarse la dosis a 2 comprimidos, administrados una vez al día. Si el paciente estaba en tratamiento previo con un diurético, éste debe suspenderse 2 a 3 días antes de comenzar el tratamiento con Tonotensil D.
- En pacientes con insuficiencia renal con un clearance de creatinina entre 30 mL y 80 mL/min se debe reducir la dosis a medio comprimido.
- En casos de insuficiencia renal severa, no es recomendable la utilización de este medicamento.
- En pacientes geriátricos, se debe hacer ajuste de dosis.

### **Modo de empleo:**

Para prevenir la hipotensión ortostática (desmayos al levantarse), las primeras dosis deben ser las mínimas de acuerdo a lo que le indique su médico. Se recomienda tomar los comprimidos al acostarse para prevenir caídas; administrar los comprimidos con un vaso de agua.

### **Sobredosis:**

**Síntomas:** Hipotensión, desmayos, pérdida electrolítica (hipokalemia, hiponatremia, hipocloremia), y deshidratación, lo que produce fatiga y cansancio.

Las medidas a tomar incluyen discontinuación de la terapia y traslado del paciente a un establecimiento asistencial para la inducción del vómito y/o lavado gástrico, corrección de la deshidratación, del desbalance electrolítico y la hipotensión.

### **Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos de alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor y humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.