

## **Ácido Mefenámico**

### **Comprimidos 500 mg**

#### **Composición y presentación:**

Cada comprimido contiene:

Ácido Mefenámico 500 mg

Excipientes: Almidón glicolato de sodio, polividona, lauril sulfato de sodio, colorante FD&C amarillo N° 5 lacado, magnesio estearato, celulosa microcristalina.

#### **Indicaciones:**

Es utilizado en dolores leves a moderadamente severos, en terapias que no excedan de una semana. Es indicado también en el manejo de dismenorrea primaria. Alivio del dolor post-inserción de dispositivos contraceptivos intrauterinos.

#### **Clasificación:**

Antiinflamatorio no esterooidal.

#### **Advertencias y precauciones:**

- Usted debe consultar a su médico antes de usar Ácido Mefenámico, si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca).
- Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.
- No tome este producto, si Ud. es alérgico a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- No tome este medicamento sin antes consultar a su médico, si usted presenta alguna alergia ya sea a otro medicamento, colorante, edulcorante o saborizante.
- El riesgo de potenciales efectos adversos se observa particularmente en pacientes que reciben terapias prolongadas con la droga.
- Se debe discontinuar la terapia y consultar a un médico si se presentan problemas gastrointestinales.
- La seguridad y eficacia de la droga en niños menores de 14 años no ha sido establecida.
- Aunque no hay información sobre estudios en humanos, no debe ser usado en la ultima etapa del embarazo.
- Su uso durante el embarazo y la lactancia debe ser evaluada por un médico.

#### **Contraindicaciones:**

- No se debe usar Ácido Mefenámico en el período inmediato a una cirugía de by-pass coronario.
- Está contraindicado en pacientes con úlcera activa o inflamación crónica del tracto gastrointestinal.
- La droga no debe ser administrada en pacientes con problemas renales pre-existentes.
- Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la droga y a aquellos en que la aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos han provocado urticaria, bronco espasmo, angioedemas, rinitis severa o shock.
- Insuficiencia hepática grave.
- Última etapa del embarazo.
- Niños menores de 14 años.

#### **Interacciones:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos:

- **Sales de Litio.**
- **Hidantoínas.** Ej.: Fenitoína
- **Salicilatos.** Ej.: Aspirina
- **Sulfonamidas.** Ej.: Sulfadiazina, sulfametoxazol.

- **Sulfonilureas.** Ej.: Clorpropamida, glibenclamida

- **Anticoagulantes.** Ej.: Warfarina

En caso de requerir atención médica por otras razones, no olvide mencionar que está tomando este medicamento.

### **Efectos adversos:**

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados, además de los que se pretende obtener.

Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados especialmente si se toman por un período prolongado de tiempo y/o en dosis grandes.

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento, consulte a su médico: Náuseas con o sin vómitos, dolor abdominal, flatulencia, constipación, gastritis, cefaleas, insomnio, mareos, visión borrosa.

La diarrea es el efecto adverso más importante. En casos de ingesta por períodos prolongados el hematocrito disminuye.

Ocasionalmente presenta cefaleas, insomnio, mareos, visión borrosa, alteraciones renales y hepáticas. Urticaria y rash.

Si Ud. nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte a su médico.

### **Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo apropiados a su caso particular, no obstante, las dosis usuales recomendadas son:

- **Adultos y niños mayores de 14 años:** En dolores moderadamente severos, la dosis inicial es de 500 mg seguido de 250 mg cada 6 horas.

- **Como analgésico:** El tratamiento no debe exceder de 1 semana.

- **Dismenorrea primaria:** La dosis inicial es de 500 mg seguido de 250 mg cada 6 horas. El tratamiento para dismenorrea no debe exceder de 2 a 3 días

### **Modo de empleo:**

Administrar por vía oral preferentemente junto con las comidas.

Tomar con un vaso lleno de agua.

### **Sobredosis:**

En caso de sospecha de sobredosis o aparición de síntomas (convulsiones, espasmos musculares, vómitos, diarrea).

Trasladar al paciente a un centro asistencial. Llevar este folleto informativo.

### **Condiciones de almacenamiento:**

Mantener en su envase original, protegido del calor, la humedad a no más de 30°C y fuera del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.