

Ifosfamida

Liofilizado para solución inyectable 1g

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico, guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

1. Composición y presentación:

Cada frasco-ampolla contiene: Ifosfamida, 1g
Excipientes: Manitol.

2. Vía de administración: infusión intravenosa

3. Clasificación: Antineoplásico

4. Recomendaciones de uso: Tratamiento del cáncer testicular y para algunos otros tipos de cáncer. Generalmente se administra junto a otro medicamento, el Mesna, para prevenir problemas a la vejiga.

5. Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión de un médico especialista.

A fin de decidir el mejor tratamiento para su problema médico se debe tener en cuenta tanto los riesgos como los beneficios que ésta le pueda traer. Esta es una decisión que usted y su médico deben tomar. Para Ifosfamida se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) Alergias: Usted debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado alguna reacción alérgica a este medicamento, o a alguna otra sustancia o a otros medicamentos.

b) Embarazo: consulte con su médico si Ud. está embarazada o si intenta estarlo.

Existe una buena posibilidad que esta medicina cause defectos congénitos, si tanto el hombre como la mujer la están tomando en el momento de la concepción o si se toma durante el embarazo. La Ifosfamida causa defectos congénitos en animales. Además algunas medicinas para el cáncer pueden causar esterilidad que podría ser permanente.

Asegúrese de haber discutido esto con su médico antes de recibir esta medicina. Es mejor usar algún método anticonceptivo, no use anticonceptivos orales ya que estos pueden interferir con este medicamento. Consulte inmediatamente con su médico si piensa que ha quedado embarazada mientras está recibiendo Ifosfamida.

c) Lactancia: Consulte con su médico si usted está amamantando o si intenta amamantar a un niño. Ya que Ifosfamida puede causar serios efectos colaterales, la lactancia generalmente no se recomienda mientras se la está administrando.

d) Niños: Aunque no hay información específica que compare el uso de la Ifosfamida en niños respecto a otros grupos de edad, no se espera que cause efectos colaterales o problemas distintos a los que causa en los adultos.

e) Pacientes de edad avanzada: muchos medicamentos no han sido probados en ancianos. De este modo, no se puede saber si actúan de la misma manera que en los pacientes adultos jóvenes o si causan efectos colaterales diferentes o problemas en los pacientes de edad avanzada.

6. Precauciones:

Es muy importante que su doctor verifique sus progresos con visitas regulares a fin de asegurarse que lfosfamida esté trabajando correctamente y para verificar sus efectos no deseados.

Mientras está siendo tratado con lfosfamida y después de terminar el tratamiento, no reciba cualquier vacuna sin la aprobación de su médico.

lfosfamida disminuye su resistencia y existe el riesgo de que pueda contraer la infección que la vacuna quiso evitar. Otras personas que están en contacto con usted también deberían evitar o no deberían recibir recientemente la vacuna oral para el poliovirus ya que existe la posibilidad de que le pasen el poliovirus a usted. También evite otras personas hayan tomado la vacuna oral para la polio. No se acerque a ellos, y no se quede en la misma habitación que ellos durante demasiado tiempo. Si no puede tomar estas precauciones, debería considerar el uso de una máscara protectora que le cubra la nariz y la boca.

lfosfamida puede reducir temporalmente el número de glóbulos blancos en su sangre, aumentando la posibilidad de contraer una infección.

También puede disminuir el número de plaquetas, las cuales son necesarias para la correcta coagulación. Si esto se produce, hay ciertas precauciones que usted puede tomar para reducir el riesgo de infección o hemorragia:

- Si puede, evite la gente con infecciones. Consulte con su médico inmediatamente si piensa que ha contraído alguna infección, o si tiene fiebre o escalofríos, tos o carraspera, puntada de costado, dolor o dificultad.
- Consulte a su médico inmediatamente si usted nota cualquier sangramiento o hematoma inusual, deposiciones negro-alquitranadas, sangre en orina o materia fecal o pequeñas pintas rojas en la piel.
- Tenga cuidado con el uso regular de cepillos de dientes, hilo dental o escarbadientes. Su médico puede recomendarle otras maneras de limpiar sus dientes o encías. Consulte con su médico antes de hacerse cualquier trabajo odontológico.
- No se toque los ojos o dentro de la nariz a menos que se haya lavado las manos y no haya tocado nada más en ese periodo de tiempo.
- Tenga cuidado de no cortarse mientras está usando objetos cortantes tales como afeitadora o tijera de cortarse las uñas.
- Evite los deportes de contacto u otras situaciones que pueda sufrir hemorragias u otras lesiones.

7. Contraindicaciones:

Este medicamento no debe ser usado en pacientes que presenten algunas de las siguientes afecciones, salvo si su médico lo indica.

- Función medular ósea severamente deprimida.
- Hipersensibilidad previa a la droga.

8. Interacciones:

Usted debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica. Aunque ciertos medicamentos nunca debieran ser usados en forma concomitante, en otros casos, dos diferentes medicamentos pueden usarse juntos aun cuando pudiera producirse una interacción. En estos casos su médico puede cambiar la dosis o tomar otras precauciones si fuere necesario.

Cuando se está en terapia con lfosfamida es especialmente importante que su médico sepa si usted está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

- Anfotericina B por vía inyectable
- Agentes antitiroideos
- Azatioprina
- Cloramfenicol
- Colchicina
- Flucitosina
- Ganciclovir
- Interferon
- Plicamicina
- Zidovudina

Si usted ha sido tratado con rayos X o con medicamentos para el cáncer, la Ifosfamida puede incrementar los efectos en la sangre, de estos medicamentos o de la terapia de radiación.

9. Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.

Usted debe comunicar a su médico si padece cualquier enfermedad, especialmente si se trata de:

- Varicela (incluyendo exposición reciente)
- Herpes zoster
- Enfermedades infecciosas
- Enfermedades renales
- Enfermedades hepáticas

10. Efectos adversos: (no deseados)

Junto con sus efectos benéficos, medicamentos análogos a la Ifosfamida pueden causar algunas veces efectos indeseados tales como problemas sanguíneos, pérdida del cabello y problemas de vejiga.

También, debido a la forma en que estas medicinas actúan en el cuerpo, existe el riesgo que puedan causar otros efectos no deseados que no se producen hasta meses o años después de ser usadas. Estos efectos tardíos pueden incluir ciertos tipos de cáncer, tales como leucemia.

Discuta estos posibles efectos con su doctor.

Aunque no todos los efectos pueden producirse, si lo hacen pueden necesitar atención médica.

Consulte a su médico inmediatamente si se produce cualquiera de los siguientes efectos colaterales:

- Más comunes: sangre en orina, orinar frecuentemente, dolor al orinar.
- Menos comunes: tos o carraspera, fiebre o escalofríos, puntada de costado.
- Raros: deposiciones negro-alquitranadas, sangre en materia fecal, manchas diminutas rojas en la piel, hemorragias o hematomas inusuales.

Consulte con su médico tan pronto sea posible si se produce cualquiera de los siguientes efectos colaterales:

- Más comunes: agitación, confusión, alucinaciones (ver, oír o sentir cosas que no son), cansancio inusual.
- Menos comunes: vértigos, enrojecimientos, hinchazón o dolor en el lugar de la inyección.
- Raros: tos o acortamiento de la respiración, convulsiones (ataques), úlceras en la boca y en los labios.

Se pueden producir otros efectos colaterales que generalmente no necesiten atención médica. Estos efectos pueden retirarse durante el tratamiento a medida que su cuerpo se adapta a la medicina. Su médico también puede decirle las formas de prevenir o reducir algunos de estos efectos.

Consulte con su médico si alguno de los siguientes efectos continúan o son molestos o si tiene alguna duda sobre ellos.

- Más comunes: náuseas y vómitos

Ifosfamida frecuentemente causa pérdida temporal del cabello. Después del tratamiento con Ifosfamida, el crecimiento del cabello puede volver a ser normal

Después de que usted deje de recibir Ifosfamida, todavía la droga puede producirle algunos efectos colaterales que necesiten atención. Durante este periodo de tiempo, consulte con su médico inmediatamente si nota alguno de los siguientes efectos colaterales: sangre en orina. Otros efectos no listados pueden también producirse en algunos pacientes. Si usted nota cualquier otro efecto consulte con su médico.

11. Forma de administración:

La dosis a usar va a depender entre otros, del diagnóstico, del peso y la altura del paciente y de si está tomando otros medicamentos. Si usted está recibiendo Ifosfamida en su domicilio siga fielmente las instrucciones de su médico.

Si tiene dudas acerca del uso adecuado del medicamento, consulte a su médico.

Ifosfamida algunas veces se administra junto con algunos otros medicamentos. Si usted está usando una combinación de medicamentos, asegúrese de tomar cada uno de ellos a la hora correcta y no los mezcle. Consulte con su médico para que lo ayude a planear una manera de acordarse de tomar los medicamentos a la hora correcta.

Mientras está recibiendo Ifosfamida es muy importante que beba mucho líquido para orinar más. También, vacíe su vejiga frecuentemente, incluyendo por lo menos una vez en la noche. Esto ayudará a prevenir problemas renales y de vejiga y mantendrá sus riñones trabajando bien.

La Ifosfamida pasa del cuerpo a la orina. Si aparece demasiado en la orina o si la orina se retiene mucho tiempo en la vejiga, puede causar irritación peligrosa. Siga las instrucciones de su médico cuidadosamente acerca de cuánto líquido debe tomar por día. Algunos pacientes deben tomar de 7 a 12 copas (3 cuartos) de líquido por día.

La Ifosfamida a menudo provoca náuseas y vómitos. De cualquier modo, es muy importante que usted continúe recibiendo el medicamento, aún si comienza a sentirse enfermo. Consulte con su médico las maneras de disminuir estos efectos.

12. Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, a no más de 25°C, luz y humedad.

No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otras personas.